

**Sedimentpetrographische
Untersuchung der Tuffe und
Tuffite des Vogelsbergs**

von

Vishwanath Singh
aus Naraingarh (Indien)

1965 № 123

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Sedimentpetrographische Untersuchung der
Tuffe und Tuffite des Vogelsbergs

der Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
zur

Erlangung des Doktorgrades

vorgelegt von

Vishwanath Singh

aus Naraingarh (Indien)



Als Dissertation genehmigt von der Naturwissenschaftlichen
Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg

Tag der mündlichen Prüfung: 21. Juli 1965

Dekan: Universitätsprofessor Dr. Th. Ernst

Berichterstatter: Universitätsprofessor Dr. Th. Ernst

Berichterstatter: Universitätsdozent Dr. K. v. Gehlen

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Einleitung und Problemstellung	3
2. Arbeitsmethodik	5
3. Mineralogische Charakteristik der einzelnen Komponenten der Tuffe	7
3.1. Magmatische Komponenten	7
3.2. Veränderte magmatische und sekundäre Komponenten der Tuffe	8
3.3. Fremdkomponenten	16
4. Die Ergebnisse der Untersuchung einiger Vorkommen und Profile	17
4.1. Die Tuffe vom Steinbruch Oeleberg bei Großenbuseck	17
4.2. Die Tuffe von Rainrod (Bohrung Nr. 1)	22
4.3. Die Tuffe vom Steinbruch Herbststein	24
4.4. Die Tuffe von Nidda (Bohrung Nr. 11)	25
4.5. Die Tuffe vom Steinbruch Oberwiddersheim	26
4.6. Die Tuffe von Staden (Bohrung Nr. 26)	29
4.7. Die Tuffe vom Steinbruch Traislumda	30
4.8. Die Tuffe von Wohnbach (Bohrung Nr. 28)	32
5. Zusammenfassung der Analyse des Stoffbestandes	34
6. Zur Genese der untersuchten Tuffe des Vogelsberges	35
6.1. Zum Chemismus der tuffliefernden Basaltmagmen	35
6.2. Zur Frage der Herkunft der Fremdkomponenten	36
6.3. Zur Umwandlung der primären Tuffkomponenten	37
6.3.1. Die hydrothermale Fazies, Montmorillonit-Tuffe	37
6.3.2. Kaolinbildung (Zur Frage der Lateritisierung)	37
6.3.3. Weitere Tonminerale in den Tuffen	39
6.3.4. Zur Farbe der untersuchten Tuffe	40
7. Zusammenfassung	41
8. Literatur	43

Tabellen:

Tab. Nr. 1-5a im Text

	im Anhang	Seite
" " 6	Verzeichnis der Fundpunkte bzw. Entnahmestellen von Tuffproben (außer Oeleberg)	46
" " 7	Entnahmestellen der Proben vom Steinbruch Oeleberg	48
" " 8	Korngrößenverteilung der Proben aus dem Steinbruch Oeleberg	50
" " 9	Korngrößenverteilung der Proben (außer Oeleberg)	51
" " 10	Mineralbestands-Tabelle der Proben (außer Oeleberg)	52
" " 11	Mineralbestand der Tuffe aus dem Steinbruch Oeleberg	53
" " 12	Mineralbestand einiger Proben (unter 60 μ m) aus dem Steinbruch Oeleberg	54

1. Einleitung und Problemstellung

In der vorliegenden Arbeit wird über die Ergebnisse von sedimentpetrographischen Untersuchungen an Tuffen und Tuffiten des Vogelsbergs berichtet.

Der Vogelsberg, der eine nahezu kreisförmige Fläche von 2000-2500 km² zwischen dem Mainzer und dem Kasseler Tertiärbecken bedeckt, ist ein Erosionsrest eines großen tertiären Basaltvulkans, der während starker Eruptionstätigkeit im Miozän durch zahlreiche kleinere vulkanische Durchbrüche zustande kam (SCHOTTLER 1920).

Nach SCHENK (frdl. mündl. Mitteilung) wurden die Tuffe während der ganzen Zeit des Vulkanismus im Wechsel mit Lava-Ergüssen gefördert. Die Tuffdecke ist nicht nur auf die Ost- und Westsenke (SCHOTTLER 1937) beschränkt, sondern auch im Hohen Vogelsberg vorhanden. Das Gebiet der Abdachung des Vogelsbergs im Osten (Ostsenke) und des Grabens im Westen (Westsenke, (SCHENK 1959)) zeichnen sich durch die Vorherrschaft feiner Tuffe aus, während im Hohen Vogelsberg Bombentuffe häufiger sind. Zentren besonderer vulkanischer Tätigkeit erscheinen heute morphologisch als Hochgebiete mit vulkanischen Aufbauten. Im Raum zwischen Hohem Vogelsberg und Rheinischem Schiefergebirge war im Miozän eine wasserüberflutete Senke, während die Bildungen der Nord- und Ostabdachung trockenes Land andeuten, das höchstens an seinem Saum anfänglich von Wasser bespült worden ist.

Alle Tuffe, die in dieser Arbeit untersucht wurden, sind sehr feinkörnig und haben ein fast toniges Aussehen, obwohl ein Tuff sonst normalerweise schon makroskopisch glasige magmatische Anteile (juvenil), ältere, aus dem gleichen Magma ausgeschiedene Minerale (authigen) und Fremdkomponenten erkennen läßt, die durch die vulkanischen Gase gefördert und auf dem Ausbruchsweg oder an der Erdoberfläche abgesetzt wurden.

Das Ziel dieser Arbeit war zunächst die Bestimmung des Mineralbestandes der vorliegenden Tuffe. Darauf aufbauend sollte, wenn möglich, die Herkunft der Tuffkomponenten und ihr Zusammenhang mit den verschiedenen Ergußdecken untersucht werden. Besonderes Augenmerk wurde auf die Bestimmung der Tonminerale mit Hilfe chemischer, thermischer und röntgenographischer Methoden gerichtet, um daraus Schlüsse auf die Umbildungsgeschichte und das geologische Milieu ziehen zu können. Die Lage der Probeentnahmepunkte geht aus Abb. 1 und Tab. 6 und 7 (im Anhang) hervor.




Abb. 1: Übersichtskarte des Vogelsberges mit den Entnahmepunkten der Proben (vergl. Tab. 6 und 7 im Anhang).

Schraffiert = vulkanische Ablagerungen des Tertiärs, z.T. unter jüngerer Überdeckung.

2. Arbeitsmethodik

Die Untersuchungen der Tuffe und Tuffite konnten mit sedimentpetrographischen Methoden durchgeführt werden, weil alle Proben aus wenig verfestigtem tonigen Material bestanden. Zur leichteren Durchführung von qualitativen und mikroskopischen Untersuchungen wurden die Proben in neun Korngrößenklassen nach der von CORRENS und SCHOTT (1932) empfohlenen Normalmethode von ODEN zerlegt:

Durch Absieben: > 1 mm; 1-0,63 mm; 0,63-0,20 mm; 0,20-0,063 mm.

Durch Sedimentation im Atterbergzylinder: 63-20 um; 20-6 um.

Durch Zentrifugieren: 6-2 um; 2-0,6 um.

Der Rest wurde mittels Vakuummembranfiltration gewonnen. Um die agglomerierten Teilchen zu trennen, erfolgte für eine Ausgangsmenge von 20 g eine Vorbehandlung in 0,01 n Ammoniakwasser (24 Std.), anschließend mechanische Zerteilung (4 1/2 Std.) in einem Mixergerät.

Die Korngrößenverteilung jeder Probe wurde mit der Pipettmethode nach KÖHN (1928) bestimmt.

Die Mineralbestimmung in den einzelnen Korngrößenklassen wurde mit den folgenden Methoden durchgeführt:

1. Röntgenverfahren. Neben den Pulveraufnahmen nach DEBYE-SCHERRER wurde vornehmlich die Methode von K. JASMUND (1956) angewandt, nach der an sedimentierten Proben mit ausgezeichneter Textur die Basisreflexe der Tonminerale schnell und sicher bestimmt werden können. Über die Ausführung siehe u.a. H. KRUMM (1961). Dieses Texturverfahren gestattet quellbare Minerale durch Behandlung mit Äthylenglykol und Glycerin leicht zu erkennen. Außerdem gaben auf 450°C und 550°C aufgeheizte Proben weitere Hinweise auf das Vorkommen bestimmter Minerale.

Die Anwesenheit von Quarz in den größeren Korngrößenklassen erlaubte in den DEBEYE-SCHERRER-Aufnahmen keine sichere Erfassung aller Röntgeninterferenzen der vorhandenen Tonminerale, doch war dann die Identifizierung mit der Texturkamera möglich.

2. DTA. Über die benutzte Apparatur zur differentiellen Thermoanalyse (DTA) siehe H. KRUMM (1961) und A. BECHER (1965).

3. Dilatometrie. Die quellbaren Tonminerale konnten besonders mit einer Dilatometer-Apparatur nach W. FORKEL (1955) bestimmt werden.

4. Kristalloptische Verfahren. Verfestigte Proben ließen Dünnschliffuntersuchungen zu, doch wurden im allgemeinen Pulverpräparate bestimmt. Das Phasen-Kontrast-

Verfahren (z.B. PILLER 1953) gestattete eine zufriedenstellende Abschätzung der Mengen in den einzelnen Korngrößenklassen. Zur Einbettung wurden Oxalester ($n = 1,481$) und Zimtaldehyd ($n = 1,62$), auch in Mischungen, verwendet. Für die quantitative Bestimmung wurden in jedem Fall mindestens 300 Körnchen ausgezählt.

5. Die chemische Zusammensetzung einzelner Fraktionen wurde mit einem 3,4 m Ebert-Gitterspektrographen der Firma Hilger durchgeführt. Die Einwaagen betrugen pro Analyse 5 mg; zur Sicherung der Werte wurden 3 Bestimmungen durchgeführt. Die Analysenwerte beziehen sich auf die bei 100°C vorgetrockneten Proben; die Analyse selbst wurde jedoch an der bei 1000°C (3 Std.) geglühten Substanz vorgenommen, der Glühverlust in der Analyse als H_2O^+ angegeben. Da die Fehlerquelle der optischen Spektralanalyse etwa $\pm 10\%$ beträgt, sind die Werte auf die Gesamtmenge von 100 % umgerechnet. Der Analytikerin, Frä. Eder, danke ich herzlich für die Ausführung dieser Arbeiten.

6. Elektronenmikroskopische Aufnahmen wurden freundlicherweise von Herrn Dr. K. Schüller, Fa. Stemag (Lauf/Pegnitz), mit einem Siemens-Elmiskop II angefertigt.

2. Mineralogische Charakteristik der einzelnen Komponenten der Tuffe

3.1. Magmatische Komponenten der Tuffe:

- a) Pyroxene sind meist nur durch Augite vertreten. Sie sind farblos bis hellgrün, nicht pleochroitisch und mäßig doppelbrechend. Der Auslöschungswinkel c/γ beträgt über 40° . Sehr selten (Steinbruch Oberwiedersheim) kommen einige rhombische Pyroxene mit γ ähnlich 1,674 vor, schwach doppelbrechend. Es handelt sich danach um Enstatit mit etwa 5-10 % Fs-Anteil; nach den Ergebnissen von ERNST (1964) dürfte ein Orthopyroxen dieser Zusammensetzung aus einer Olivinknolle stammen.
- b) Amphibole: Selten tritt Hornblende auf. In Probe Nr. 57 finden sich genetisch interessante, zerrissene große Hornblenden, die darauf hindeuten, daß in der Lava zur Zeit des Ausbruchs bereits Mineralien ausgeschieden waren, die während der Eruption gefördert und danach zerbrochen wurden.
- c) Feldspäte: Der Plagioklas ist Andesin-Labrador mit 50+5 % Anorthitgehalt und γ ähnlich 1,560. Die leistenförmigen Kristalle sind fast stets verzwillingt, und zwar vorwiegend nach dem Albitgesetz. In den meisten Proben sind sie frisch erhalten geblieben.
- d) Biotit ist nur in Probe Nr. 59 sehr verbreitet. Die kleinen idiomorphen Blättchen zeigen einen Korndurchmesser von 20- >1000 μ m.
- e) Magnetit: Die oktaedrischen Kristalle, Korngröße 20 - >200 μ m, sind meistens gleichmäßig verteilt. Vorwiegend kommen sie in den Lapilli-führenden Tuffen vor.
- f) Hämatit kommt als färbende Substanz vor, die durch die starken Interferenzen mit $d = 3,68 \text{ \AA}$, $2,69 \text{ \AA}$ und $2,51 \text{ \AA}$ in den Jasmund-Aufnahmen charakterisiert wird.
- g) Glas: Frisches Glas, im Pulverpräparat hellbraun, isotrop oder sehr schwach doppelbrechend, ist außerordentlich selten. Der Brechungsindex konnte nur an wenigen Proben bestimmt werden mit n etwa 1,554. Nach WILLIAMS (1924) sollte nach der Lichtbrechung ein verhältnismäßig basisches Glas vorliegen.
- h) Basalt-Einschlüsse (Lapilli): Sie treten selten auf und unterscheiden sich nach Größe, Zusammensetzung und Erhaltungszustand.

In Probe Nr. 55 findet man eingeschlossen in die Grundmasse einige

Feldspatlapilli, die aus über 90 % sehr feinem Plagioklas und etwa 10 % Pyroxen (Augit) und Magnetit bestehen. Die Feldspäte sind hier verhältnismäßig frisch.

Für die genetischen Fragen sind die in der montmorillonitreichen Grundmasse vorkommenden basaltischen Anteile sehr wichtig, die aufgrund der zahlreichen Augite und Magnetite und den völlig zersetzten Feldspäten erkannt werden können und die gegenüber dem Tuff eine braune Randzone zeigen. Die Olivine sind ebenfalls völlig zerstört; im Dünnschliff deuten die Löcher mit den charakteristischen Umrissen auf die frühere Anwesenheit hin. Die blasigen Hohlräume sind teilweise mit SiO_2 gefüllt. Bemerkenswert ist das Zersetzungsprodukt der Feldspäte, das im wesentlichen aus Kaolin besteht.

3.2. Veränderte magmatische und sekundäre Komponenten der Tuffe:

a) Montmorillonit.

Aussehen und Optik: In den Proben beobachtet man farblose bis braune Flecken und Nester von Montmorillonit, die rundliche und auch stachelige, konkav umgrenzte Formen bilden mit einer Größe von etwa $6\text{ }\mu\text{m}$ bis $600\text{ }\mu\text{m}$. Ihre Innenstruktur ist schalig-sphärolithisch und besteht aus feinsten faserigen oder schuppigen Aggregaten. Die Doppelbrechung ist meist sehr niedrig und die mittlere Lichtbrechung kleiner als 1,542. Da diese Aggregate teilweise, wenn auch selten, Übergänge zu fast isotropen Glasresten zeigen, dürften die Montmorillonit-Aggregate zumindest teilweise aus der Zersetzung von Glasfetzen entstanden sein. In einigen Fällen sind auch Texturen von montmorillonit-gefüllten Blasen noch erhalten.

Aus den genannten Gründen können die Montmorillonit-Aggregate überwiegend als zersetztes vulkanisches Glas gedeutet werden.

Dilatometrie: Die Dilatometer-Kurve einer Montmorillonit-Tuffprobe zeigt zwischen $100\text{--}250^\circ\text{C}$ eine sehr starke Schwindung von mehr als 3 % (siehe Abb. 2), die auf ein quellfähiges Mineral deutet, das in diesem Temperaturbereich sein adsorbiertes Zwischenschicht-Wasser verliert und die für Montmorillonit charakteristisch ist. Die beobachtete Schwindung von mehr als 3 % stimmt recht gut mit der Schwindung "reiner" Montmorillonite überein (FORKEL 1955, S. 8). Ebenfalls entspricht die Dehnung bei 500 bis 600°C dem endothermen D.T.A.-Haupteffekt des Montmorillonits, der durch die Abgabe des Konstitutions-Wassers (OH-Gruppen) verursacht wird.




Abb. 2: Charakteristische Dilatometer-Kurve
eines Montmorillonit-Tuffes mit zugehö-
riger DTA-Kurve (Probe Nr. 1).

Röntgen-Analyse: Auf den Debye-Scherrer-Aufnahmen sind die Reflexe des Montmorillonits schlecht zu erkennen, weil sie von den vorherrschenden Linien des Quarzes in den meisten Proben überdeckt werden. Eine Ausnahme bildet die Aufnahme von Probe Nr. 5, die auch den 060-Reflex von Montmorillonit (bei $1,49 \text{ \AA}$) zeigt.

Aus Jasmund-Aufnahmen geht hervor, daß der Montmorillonit dem dioktaedrischen Typ mit vorwiegender R^{2+} Besetzung in der Oktaederschicht angehört. Dem entspricht der Abstand d_{060} von $1,49 \text{ \AA}$. Die Zwischenschichten sind im wesentlichen mit Mg und Ca besetzt, weil der 001-Reflex in luft-trockenem Zustand um $15 \text{ \AA}$ liegt und nach Glyzerinbehandlung bis über $18 \text{ \AA}$ quillt.

Elektronen-Mikroskopie: (Siehe Abb. 3). Die elektronenmikroskopischen Aufnahmen zeigen Montmorillonit als sehr kleine unregelmäßige Teilchen. Einige sind flockenförmig mit sehr unregelmäßiger Umrandung.




Abb. 3: Elektronenmikroskopische Aufnahme
von Montmorillonit (Probe Nr. 25),
Fraktion 2-0,6 μm .
Vergr. 15000:1.

DTA-Befunde und Mg-Gehalte: Obwohl bei der Röntgenanalyse und den optischen Untersuchungen die Montmorillonite ganz einheitlichen Charakter zeigen, sind die Unterschiede in ihren DTA-Kurven sehr auffallend. Die DTA ist hier der Röntgenmethode überlegen; sogar kleine Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung ließen sich feststellen. Die Variationen der DTA-Kurven sollen hier ausführlich diskutiert werden, und zwar unterteilt nach drei Temperaturbereichen.

100-300°C: ohne Ausnahme zeigen alle Montmorillonite in diesem Bereich zwei endotherme Reaktionen aufgrund des Verlustes des Zwischenschichtwassers, zwischen 100-200°C, mit ganz ähnlicher Kurvenausbildung.

500-700°C: in diesem Temperaturbereich zeigen sich dagegen bedeutende Unterschiede in den endothermen Reaktionen. Hier handelt es sich um den Verlust von (OH)-Gitterwasser. Nach diesen Variationen lassen sich folgende zwei Typen charakterisieren: Die meisten Montmorillonite zeigen eine endotherme Reaktion zwischen 500-600°C, während einige andere zwei Reaktionen, nämlich 500-600°C und zwischen 600-700°C zeigen. Die Reaktion zwischen 600-700°C ist nur in den Kurven der Korngrößen unter 6 μm erkennbar.

Nach der Literatur zeigt ein gut kristallisierter Montmorillonit nur eine endotherme Reaktion zwischen 600-700°C, und bisher ist kein Zusammenhang zwischen der Lage und Größe des Peaks dieser Reaktion und der chemischen Zusammensetzung festgestellt worden.

Wenn man den optischen Befund und die DTA-Ergebnisse vergleicht, dann ergibt sich, daß der Montmorillonit mit endothermer Reaktion zwischen 500-600°C sehr oft Zersetzungsübergänge zu Glas in den Aggregaten zeigt, während Montmorillonit mit endothermer Reaktion zwischen 600-700°C durchweg feinkristallin ist.

Beidellit und Nontronit, die ebenfalls ihre endotherme Hauptreaktion zwischen 500-600°C zeigen, liegen nach den Ergebnissen der chemischen und optischen Untersuchungen nicht vor.

Es könnte sein, daß Montmorillonit mit einfacher endothermer Hauptreaktion bei 500-600°C in den gröberen Fraktionen nicht kristallisiert ist. nach DUNNING und PERTSHIRE (MACKENZIE 1957, S. 256-257) zeigen anomale Montmorillonite mit unregelmäßiger Kristallstruktur eine endotherme Hauptreaktion zwischen 500-600°C. Die doppelte endotherme Reaktion könnte dann durch ein Gemisch von normalem und anomalem Montmorillonit hervorgerufen sein.

Teilweise könnte die endotherme Reaktion zwischen 500-600°C auch von Illit oder Kaolin herrühren, die in den meisten Proben vorhanden sind.

700-1000°C: Montmorillonit ist hier durch eine endotherme Reaktion um etwa 880°C und eine exotherme Reaktion um etwa 900°C charakterisiert. Sehr bemerkenswert ist jedoch der Unterschied in der Größe von entsprechenden Reaktionen in verschiedenen Proben. Zum Vergleich sind einige charakteristische DTA-Kurven und entsprechende chemische Analysen in Abb. 4 und Tabelle 1 dargestellt. Danach ergibt sich, daß eine Vergrößerung des endothermen Peaks jeweils ohne Ausnahme mit zunehmendem Mg-Gehalt zusammenhängt, wie es bereits von PAGE (1943) angegeben wurde. J.W. EARLY, I.H. MILNE und Mc. WEAH (1953) deuten solche Unterschiede jedoch entweder durch eine Anwesenheit von diskreten (OH)-Gruppen zwischen den Tetraeder-Schichten, wie die schon EDELMANN & FAVEJEE (1940) und Mc. CONNELL (1950) annahmen, oder auch durch Verunreinigungen mit Wasser-Gehalten. Nach BARSHAD (1948, 1950) bestimmt aber die Art der austauschbaren Kationen den Grad der Gitterdehnung und den Grad der Hydratation; nach ihm werden mit zunehmendem Mg-Gehalt die Reaktionen

größer, womit die Befunde dieser Arbeit übereinstimmen.




Abb. 4: Charakteristische DTA-Kurven
verschiedener Montmorillonite
jeweils Fraktion $< 0,6\text{-}\mu\text{m}$.

Probe Nr. Korngröße	30 $< 0,6$	65 $< 0,6$	46 $< 0,6$	56 $< 0,6$	63 $< 0,6$ μm
SiO_2	57,9	60,7	52,5	54,2	52,9
TiO_2	2,2	1,0	1,2	1,8	1,1
Al_2O_3	15,4	16,1	15,9	15,5	14,0
Fe_2O_3	10,7	6,7	10,7	7,5	5,6
MnO	0,02	0,02	0,1	0,07	0,1
MgO	3,5	4,1	7,1	8,4	10,7
CaO	2,4	1,9	3,1	2,1	5,3
Na_2O	-	0,3	-	-	-
K_2O	-	-	-	-	0,5
H_2O^+	7,9	9,2	9,4	10,4	9,8

Tabelle Nr. 1:

Chemische Analyse der
Proben von Abb. 4.

Werte auf 100 % umgerechnet.

b) Prochlorit.

Die Korngröße dieser besonders am Oeleberg beobachteten Chlorite ist sehr verschieden. Für Glieder der Prochlorit-Reihe spricht z.B. die hohe Lichtbrechung von 1,62 und die niedrige Doppelbrechung (oft fast 0).

c) Pennin-Gruppe.

Neben Prochloriten treten in Oberwiddersheim Mineralien der Pennin-Gruppe auf, deren Lichtbrechung bei 1,575 liegt, bei deutlichem Pleochroismus.

Die Chlorite, die nur in sehr geringer Menge vorhanden sind, besitzen die kennzeichnende 14 Å-Interferenz, die nach Glyzerinbehandlung unverändert bleibt. Weil aber die 001-, 002 und 005-Reflexe normalerweise sehr schwach ausgebildet sind und die 002-Linie um 7 Å und die 003-Linie um etwa 5 Å mit dem 001-Reflex von Kaolin und dem 002-Reflex von Illit zusammenfallen, wurden die Proben bis 450°C und 550°C aufgeheizt und wieder untersucht. Nach 550°C sind praktisch alle Chlorit- und Kaolin-Reflexe verschwunden, während nach 450°C eine sehr deutliche Intensitätsabnahme sedimentär gebildeten Chlorit~~s~~ anzeigt. (Bei metamorph gebildeten Chloriten werden die Reflexe nach Aufheizen auf 550°C sogar verschärft).

d) Kaolin-Mineral.

Wesentliche Mengen von Kaolin treten nur in fünf Proben auf, von denen zwei näher beschrieben werden (Nr. 77 und Nr. 39, letztere siehe S. 28).

Die Probe Nr. 77 besteht überwiegend aus Kaolin, der sehr oft bis über 200 µm große Aggregate bildet. Er ist mit einer mittleren Lichtbrechung um etwa 1,560 fast farblos und sehr feinkristallin. Nach den DTA-Kurven mit einem endothermen Peak um 100°C - sehr deutlich auch in der Fraktion von 60-20 µm (Abb. 5), wo der Montmorillonit praktisch fehlt - zeigt dieses Mineral metahalloysitischen Charakter; gut kristallisierter Kaolin sollte keinen exothermen Peak um etwa 100°C zeigen. Im Gegensatz zu Fireclay liegt die exotherme Reaktion über 950°C.

Die DTA-Diagnose von Metahalloysit oder schlecht kristallisiertem Kaolin wird auch durch Röntgen-Aufnahmen bekräftigt, in denen die 001- und 002-Interferenzen um 7,15 Å und 3,56 Å charakteristisch breit und diffus sind.




Abb. 5: Charakteristische DTA-Kurven der Probe Nr. 77.




Abb. 6: Elektronenmikroskopische Aufnahme der Probe Nr. 77.
Fraktion $< 0,6 \mu\text{m}$
Vergr. 15000:1

Das Kaolin-Mineral, das in sehr kleiner Menge in einigen anderen Proben meist unter $6\text{ }\mu\text{m}$ vertreten ist, wurde aufgrund der $7\text{ }\text{\AA}$ -Interferenz in bis 450°C aufgeheizten Proben identifiziert. In solchen Proben konnten keine für Kaolin-Mineralien charakteristischen Reaktionen in der DTA-Aufnahme beobachtet werden, was an den geringen Mengen liegen mag, oder an der Koinzidenz der Hauptreaktion zwischen $500\text{--}600^{\circ}\text{C}$ mit denen des Montmorillonits. Eine exotherme Reaktion bei 980°C fehlt völlig.

Im Elektronen-Mikroskop erscheint Kaolin meistens flockenförmig, selten mit gut kristallisierter hexagonaler Form. Der längliche Kristall (Röllchen ?) in Abb. 6 dürfte Metahalloysit oder evtl. Halloysit sein.

e) Illit.

Illit, der in verschiedenen Proben in wechselnder Menge vorkommt, ist von dioctaedrischem Typ. Die Intensität seiner 001- und 002-Interferenzen um $10\text{ }\text{\AA}$ und $5\text{ }\text{\AA}$ ist fast gleich, im Gegensatz zum trioktaedrischen Typ, bei dem die 002-Interferenz nach NAGELSCHMIDT (1937) sehr schwach ausgebildet ist.

f) Unregelmäßige Illit-Montmorillonit-Wechselagerung.

In Probe Nr. 36 deutet die Anwesenheit eines diffusen, breiten Bands um $10\text{--}11,5\text{ }\text{\AA}$, dessen einer Rand bis $13\text{ }\text{\AA}$ nach Behandlung mit Glycerin quillt, nach der von WEAVER (1956) angegebenen Tabelle das Vorhandensein eines mixed-layer-Mineralis mit etwa 30 % quellbaren Schichten an.

g) Zeolithe.

Analcim oder Natrolith: Bei einer Lichtbrechung um 1,48 farblos und sehr schwach doppelbrechend bis fast isotrop (Oberwiddersheim).

Chabasit ist selten, farblos und sehr schwach doppelbrechend. Die Lichtbrechung liegt um etwa 1,490 (Oeleberg).

h) Calcit.

Mit Ausnahme von Probe Nr. 71 ein seltener Gemengteil. Die meisten Proben sind völlig frei davon.

i) Dolomit.

In Probe Nr. 71, wo die Karbonatminerale mehr als 80 % der gesamten Probe ausmachen, ist Dolomit, in gut ausgebildeten Rhomboedern, auf die gröberen Korngrößenklassen beschränkt. Zusätzlich wurde er durch Anfärbe-Methoden und Bestimmung der Brechzahl identifiziert.

3.3. Fremdkomponenten:

a) Basalt-Einschlüsse. (Vgl. S. 7 u. 8)

b) Quarz.

Bei einer mittleren Lichtbrechung um 1.547 ist er scharfkantig bis sehr selten subangular. Obwohl er sehr häufig ist, findet man nicht oft spezifische Korrosionsoberflächen oder Reaktionsränder. Ausgesprochen selten sind idiomorph ausgebildete Kristalle mit beiderseitigen Rhomboederflächen.

Obgleich in allen Proben Quarz vorhanden ist, ist seine endotherme Reaktion bei 573°C in den DTA-Kurven kaum zu beobachten, wenn weniger als 10 % vorhanden sind, wie dies in den feinen Fraktionen der Fall ist. In Dilatometerkurven wird die α - β -Umwandlung des Quarzes von der gleichzeitigen Montmorillonit-Schwindung überdeckt, ist aber im Abkühlungsteil der Kurve sehr gut erkennbar.

4. Die Ergebnisse der Untersuchung einiger Vorkommen und Profile.

Die Korngrößenverteilung und der Mineralbestand werden in den Tab. 8, 9, 10, 11 und 12 wiedergegeben (Anhang).

1. Die Tuffe vom Steinbruch Oeleberg bei Großenbuseck.

Das Tufflager im Basaltsteinbruch steht unmittelbar hinter und über dem Basalt in der Südwand des Steinbruchs an. Die Wand an der Südwestseite hat eine Höhe von etwa 10 m und an der Nordwestseite von 3-5 m. In der Baugrube vor dem Brecher sind die Tuffe sattelförmig aufgepreßt. Die Tuffe des Oelebergs sind nach SCHENK (frdl. mündl. Mitt.) die ältesten des Vogelsberggebietes.

In der Kontaktzone zwischen dem Basalt und den Tuffen sind diese in einer 4-5 cm breiten Zone dunkelviolettblau gefärbt.

In Abb. 7 sind die Korngrößenverteilung und der Mineralbestand für einige repräsentative Proben graphisch dargestellt.




Abb. 7: Korngrößenverteilung und Mineralbestand der Proben
Nr. 17, 26 und 9 (von links nach rechts).

Die meisten Proben, deren Zusammensetzung im einzelnen in Tabelle 8 aufgeführt ist, zeigen zwei Korngrößen-Maxima, nämlich unter $6\text{ }\mu\text{m}$ und zwischen $6\text{--}200\text{ }\mu\text{m}$, während die Kurven in einigen Fällen drei Maxima zeigen. Die Maxima zwischen 6 und $200\text{ }\mu\text{m}$ treten bei Vorherrschaft von Pyroxenen und Fremdkomponenten auf. Montmorin-Aggregate kommen in allen Proben häufig vor und reichen von der Korngröße $< 6\text{ }\mu\text{m}$ bis $600\text{ }\mu\text{m}$.

Mit abnehmender Korngröße zeigen alle Proben eine Abnahme der magmatischen und fremden Komponenten und steigende Gehalte an Tonmineralien. Illit und Kaolin sind nur auf die Größenklassen unter $6\text{ }\mu\text{m}$ beschränkt.

Es kann vorkommen, daß Proben mit weit überwiegendem Montmorillonitgehalt bei etwa gleichbleibendem Gehalt an Fremdkomponenten ihr Korngrößenmaximum weit über $6\text{ }\mu\text{m}$ auch unter $6\text{ }\mu\text{m}$ haben.

Mineralbestand: Siehe Abb. 8 und Tabelle 11 und 12 (Anhang).




Abb. 8: Mineralbestand im Profil Oeleberg Nr. 1.

Tonminerale: Die Hauptkomponente ist immer Montmorillonit, dazu sehr wenig Illit, Chlorit (Prochlorit) und Kaolin. Der Montmorillonit-Gehalt wechselt in verschiedenen Schichten von 50 bis 90 %.

Magmatische Komponenten: Hauptsächlich Pyroxene und weniger Feldspäte (nur in Probe Nr. 5 und 14 im Profil I und in Nr. 26 im Profil II etwas reichlicher vorhanden) und sehr selten Hornblenden. Das ausschließliche Auftreten von Pyroxenen und Feldspäten in Proben, in denen Lapilli vorhanden sind und ihre mittlere Korngröße führen zum Schluß, daß sie im Falle der Oeleberg-Tuffe meist aus Lapilli stammen. In anderen Proben, wo sie nur in Spuren auftreten, sind sie als "Rest" klassifiziert.

Fremd-Komponenten: Nur Quarz, dessen Gehalt von etwa 1 bis über 20 % wechselt. Der Quarzgehalt scheint sehr unregelmäßig verteilt zu sein, weil die Quarzgehalte der beiden Profile kaum übereinstimmen.

Opakanteil: Die Fe-Oxide sind nach Röntgenanalyse hauptsächlich Hämatit und selten Magnetit.

DTA-Kurven von einigen repräsentativen Proben sind in Abb. 9 dargestellt.




Abb. 9: Charakteristische DTA-Kurven einiger Proben vom Steinbruch Oeleberg.

Die DTA-Kurven werden fast nur durch die Montmorillonitreaktionen charakterisiert.

Die in manchen Fällen auftretende endo- und exotherme Reaktion zwischen 300 und 400°C kann auf Eisenoxide oder organische Substanz zurückgeführt werden.

Dünnschliffe: In der Kontaktzone sind die Tuffe dunkelbraun verfärbt. Sonst sind keine Unterschiede im Mineralbestand der entsprechenden Zonen erkennbar. Die Anwesenheit von etwa 10 % Pyroxen in der Fraktion 60-6 μm (vergl. Tabelle 12), die im Dünnschliff nicht erkennbar sind, könnte durch eine Beimischung eines basaltischen Anteils in dieser Kontaktzone hervorgerufen worden sein.

Chemische Analyse: Die Ergebnisse der chemischen Analysen sind in Tabelle 2 wiedergegeben.

Probe Nr.	5	5	5	16	26	26	26	30	
Korngr.	60-20	6-2	0,6	0,6	60-20	6-2	0,6	0,6	in μm
SiO ₂	47,90	50,00	52,80	54,80	58,30	52,80	50,00	57,90	
TiO ₂	2,40	3,20	1,70	1,80	1,70	1,60	1,30	2,20	
Al ₂ O ₃	11,90	12,50	12,10	12,70	11,40	15,00	16,20	15,40	
Fe ₂ O ₃	11,20	12,90	12,90	11,80	10,40	11,10	13,10	10,70	
MnO	0,16	0,17	0,12	0,06	0,13	0,13	0,10	0,02	
MgO	7,30	5,70	5,90	6,80	3,80	4,10	4,70	3,50	
CaO	7,40	4,50	2,70	2,60	3,50	2,60	2,20	2,40	
Na ₂ O	0,60	--	--	--	1,10	0,80	--	--	
K ₂ O	0,60	(1,30)	(1,00)	--	0,70	0,60	--	--	
H ₂ O ⁺	10,60	9,80	10,80	9,40	9,00	11,30	12,40	7,90	

Werte auf 100 % umgerechnet.

Tabelle 2: Chemische Analysen einiger Tuffe aus dem Steinbruch Oeleberg.

Der zunehmende Gehalt von Al_2O_3 und der abnehmende Gehalt von SiO_2 mit abnehmender Korngröße entsprechen dem abnehmenden Fremdquarz-Anteil und den zunehmenden Tonmineralien. Sonst zeigt der Al_2O_3 -Gehalt, der in verschiedenen Proben zwischen 12-16 % wechselt, keine wesentlichen Schwankungen.

Der SiO_2 -Gehalt bleibt nach Abrechnung von Fremdquarz besonders in den kleineren Fraktionen, die fast ausschließlich aus Montmorillonit bestehen (wasserfrei berechnet), stets bei etwa 53-57 %. Da der SiO_2 -Gehalt in den saueren Basalten ("Trapp") ungefähr diesem Wert entspricht, fand wahrscheinlich bei der Umwandlung der Gläser keine Wegführung von Kieselsäure statt. Die Gläser könnten deshalb den Trappen, d.h. den Magmen mit gabbroditischer Zusammensetzung entsprochen haben.

Von Probe zu Probe zeigt der MgO-Gehalt in der Fraktion $\leq 0,6 \mu\text{m}$ eine merkwürdige Variation von 3,5 % bis 6,8 %, während CaO fast konstant bleibt (2,2 % bis 2,7 %). Der Einfluß des wechselnden MgO-Gehalts auf die Eigenschaften des Montmorillonits wurde ausführlich auf Seite 11 diskutiert.

4.2. Die Tuffe von Rainrod (Bohrung Nr. 1).

Von der 400 m tiefen Bohrung wurden 5 Tuffproben entnommen, deren Teufenlage aus Tab. 1 zu entnehmen ist.




Abb. 10: Korngrößen-Verteilungskurven
der Proben 56 und 59
(Bohrung Rainrod).

Die in Abb. 10 gegebenen Korngrößen-Verteilungskurven der Proben 56 und 59 sind sehr ähnlich. In Probe 56 sind neben vorherrschendem Montmorillonit sehr wenig Kaolin und Illit, etwa 12 % Augit, wenige Hornblenden sowie 2 % Quarz und Fe-Oxide vorhanden. Obwohl der Montmorillonit auch in Probe 59 das Hauptmineral darstellt, ist hier Kaolin nur in Spuren vorhanden und statt des Pyroxens treten etwa 4 % Biotit auf, teilweise mit über 4 mm Durchmesser.




Abb. 11: DTA-Kurven
der Proben 56 und 59.

Charakteristische DTA-Kurven sind in Abb. 11 dargestellt. Obwohl das vorherrschende Tonmineral in beiden Horizonten Montmorillonit ist, sind die Unterschiede im Temperaturbereich 880-920°C bemerkenswert, die Peaks (endo- und exotherm) sind bei Probe Nr. 56 viel größer. Die wahrscheinlichen Gründe für diese Unterschiede sind auf Seite 11 diskutiert.

Röntgenographische und optische Untersuchungen zeigen, daß beide Horizonte aus Montmorillonit, sehr wenig Kaolin, dioktaedrischem Illit und Hämatit bestehen.

Die hellgrau-grünen Schichten innerhalb der braunen Tuffe (Probe Nr. 59, vgl. Tab. 1) enthalten etwa 12 % Magnetit, welcher in der braunen Zone fast nicht vorhanden ist. Sonst zeigen die hellgrau-grünen und braunen Schichten fast den gleichen Mineralbestand.

Von etwas verfestigten Proben aus der gleichen Bohrung wurden 3 Dünnschliffe hergestellt. Die Probe Nr. 55 (52,1-53 m Teufe) zeigt etwa 8-10 % Augit und etwas Biotit mit 3-4 % eckigem Quarz in sehr feinkristalliner dunkelbrauner Montmorillonit-Grundmasse. Eingeschlossen in diese Tuffe findet man einige Feldspat-Lapilli, die aus über 90 % sehr feinem Plagioklas und etwa 10 % Pyroxen (Augit) und Magnetit bestehen.

Die Probe Nr. 57 (89,2 m Teufe) besteht aus Einzelkristallen von Hornblende, Augit, Aegirinaugit und Magnetit, die in einer sehr feinkörnigen, hellgrauen, tonigen Grundmasse unregelmäßig verteilt sind. Genetisch interessant sind hier einige zerbrochene große Hornblendene. Obwohl der glasige Anteil völlig zu Montmorillonit zersetzt ist, sind alle magmatischen Mineralien fast frisch erhalten geblieben.

Die Probe 58 (200-200-1 m Teufe) zeigt genetisch bedeutsame Einzelheiten. Als Bestandteile dieses blasenreichen und weitgehend montmorillonitisierten Tuffs erscheinen noch zahlreiche unzersetzte Pyroxene und sehr selten Plagioklas. Olivine sind nur noch nach dem Umriß als Pseudomorphosen von Montmorillonit nach Olivin erkennbar. Dieses Pseudomorphosen-Material, gelegentliche Rißfüllungen und die Grundmasse, die im wesentlichen gleicher Art sind, sind farblos bis leicht braun. Die mittlere Lichtbrechung dieses Montmorillonits liegt um 1,50-1,52. Röntgenographisch ist er charakterisiert durch seine 001-Interferenz um 15 Å, die nach Glyzerinbehandlung bis 18 Å quillt.

Diese Befunde führen zum Schluß, daß der Montmorillonit hier zum Teil diagenetisch aus Lösungen in den Rissen und Hohlräumen ausgeschieden worden ist.

	56	59
SiO ₂	54,20	52,70
TiO ₂	1,80	3,30
Al ₂ O ₃	15,50	15,70
Fe ₂ O ₃	7,50	12,90
MnO	0,07	0,07
MgO	8,40	3,30
CaO	2,10	3,20
Na ₂ O	--	--
K ₂ O	--	--
H ₂ O ⁺	10,50	8,90

Tabelle 3: Chemische Analyse der
Probe Nr. 56 und 59,
Fraktion $< 0,6 \mu\text{m}$.

Werte auf 100 % umgerechnet.

Chemische Analyse: Die Ergebnisse der chemischen Analysen (Probe 56 u. 59) von den Fraktionen $< 0,6 \mu\text{m}$, die fast den gleichen Mineralbestand, aber merkwürdige Unterschiede in den DTA-Kurven im Bereich 850-920°C aufweisen, sind in Tabelle Nr. 3 gegeben. Danach zeigt sich in Probe 56 eine deutliche Verminderung von TiO₂, Fe₂O₃ und CaO gegenüber Probe 59, während der MgO-Gehalt mit 5,1 % und der Glühverlust mit 1,6 % höher sind.

4.3. Die Tuffe vom Steinbruch Herbstein (Probe Nr. 75 und 76).

Es kommen im Bruch dunkelrote Tuffe vor, die unter dem Basalt liegen. Am Kontakt sind sie bis zu etwa 4-5 cm Abstand dunkelviolettfärbt.

Die dunkelroten Tuffe bestehen aus zahlreichen Pyroxenen (Augiten), etwas eckigem Quarz und selten zersetzten Plagioklasen, die in sehr feinkörniger, rot gefärbter, toniger Grundmasse unregelmäßig verteilt sind. Glasreste, reich an elliptischen Blasen, leicht braun gefärbt, mit Mikrolithen von Augit sind an einigen Stellen erkennbar. Man findet hier alle Übergänge der Zersetzung von Glas zu sehr feinkörnigem, tonigen Material. Einige Blasen, gefüllt mit fast farblosem tonigem Material in unverwitterten glasigen Partien beweisen diagenetische Wanderung in kolloidalen Lösungen.

Im Vergleich zeigt die Kontaktzone wie im Falle des Oelebergs keine bemerkenswerten Unterschiede. Die Tuffe sehen hier nur im Dünnschliff etwas dunkler braun aus.

Nach DTA und Röntgen-Analyse besteht die tonige Grundmasse hauptsächlich aus Montmorillonit und sehr wenig Kaolin, wobei letzterer nur unter $0,6 \mu\text{m}$ erkennbar ist. Das rot färbende Material ist nur Hämatit.

4. Die Tuffe von Nidda (Bohrung 11, Probe Nr. 53).




Abb. 12: Lage der Probe Nr. 53 und der braunen Zone im Bohrprofil Nidda Nr. 11.

Hier ist ein 1,40 Meter mächtiger Tuffhorizont zwischen zwei Basalt-ergußdecken eingeschaltet. Diese gelbgrauen Tuffe, die an der Sohle brecciös (Basaltfragmente, vgl. Seite 7) sind, weisen zwischen 22,25 m und 22,50 m Teufe (vgl. Abb. 12) eine dunkelbraun gefärbte Zone auf.




Abb. 13: Charakteristische DTA-Kurven.

Die DTA-Kurven der gelbgrauen und der dunkelbraunen Zone sind in Abb. 13 dargestellt.

Mineralbestand: Montmorillonit ist die Haupt-Tonkomponente; in der braunen Zone sind etwas mehr Kaolin und Hämatit vorhanden. Eckiger Quarz und Pyroxen sind sehr selten. Sie sind in der tonigen Grundmasse unregelmäßig verteilt. Die Pyroxene sind frisch. Optisch zeigt der Montmorillonit des gelblichen Teils mit seiner mittleren Lichtbrechung um 1,542 sehr oft diagenetische Textur und Übergänge zu zersetztem Glas, wobei sphärolithische und blasige Füllungen auftreten. Dagegen zeigt die braune Zone keine diagenetischen Texturen. Oft findet man in dieser Zone Reste von gelblichen Tuffen, die darauf hindeuten, daß die braune Zone aus diesen entstanden ist.

4.5. Die Tuffe vom Steinbruch Oberwiddersheim.

Nach SCHENK (1964, S. 15) bilden die Tuffe das Liegende des relativ sauren Basaltes des Obersten Gildewaldes. Im Hangendsten des Steinbruchs Nickel haben sie eine Mächtigkeit von 10-20 Metern. Sie sind gut geschichtet, aber in den obersten Metern (Probe Nr. 39) sind die Schichten umgelagert. Als Einschlüsse von Nußgröße bis zu über kubikmetergroßen Massen sind sie auch im Basalt zu beobachten (Probe Nr. 41).

Korngrößenverteilung und Mineralbestand (siehe Abb. 14 und 15):




Abb. 14: Korngrößenverteilung von Tuffen vom Steinbruch Oberwiddersheim, in Abhängigkeit vom Mineralbestand (Proben Nr. 40, 39 und 41, von links nach rechts). Zeichenerklärung bei Abb. 8.




Abb. 15: Mineralbestand der Proben aus dem Steinbruch Oberwiddersheim.
Zeichenerläuterung bei Abb. 8.

Alle Tuffproben bestehen aus etwa 40-50 % Anteilen unter 6 µm (mit Ausnahme von Probe Nr. 39) und zeigen große Ähnlichkeit mit den Oeleberg-Tuffen, nämlich 75-90 % Montmorillonit als Haupttonmineral und sehr wenig dioktaedrischen Illit, Kaolin und Chlorit. Dagegen zeigen die braunen Tuffe (Probe Nr. 39) des obersten, umgelagerten Horizonts einen sehr hohen Quarzgehalt von etwa 50 % und eine Anreicherung von Kaolin (Fireclay). Montmorillonit ist hier nur mit bis zu 13 % vertreten. Zu den hier auftretenden rhombischen Pyroxenen und Zeolithen vergl. S. 15.

DTA (siehe Abb. 16):




Abb. 16: Charakteristische DTA-Kurven einiger Tuffproben vom Steinbruch Oberwiddersheim.

Nach den DTA-Kurven sind zwei charakteristische Typen in diesen Tuffen zu unterscheiden. Die montmorillonit-führenden Schichten sind sehr ähnlich denen des Oeleberg. In Probe Nr. 39 sind in den Fraktionen über 6 μ m nur die Reaktionen von Quarz erkennbar. In den feineren Fraktionen entspricht nach der Form der DTA-Kurven das Kaolinmineral dem Fireclay, wobei die exotherme Reaktion unter 950°C liegt.

Eine endotherme Montmorillonit-Reaktion um 900°C ist hier nicht erkennbar.

Chemische Analysen: sind in Tabelle Nr. 4 wiedergegeben.

Probe Nr.	39	39	39	39	41	40	43
Korngröße	ges.	60-20	6-2	<0,6	<0,6	ges.	ges. in μ m
SiO ₂	77,90	84,20	54,40	44,90	59,40	53,20	62,20
TiO ₂	1,00	1,10	1,90	1,10	2,00	3,20	2,60
Al ₂ O ₃	7,50	5,90	21,50	24,10	14,00	15,00	14,00
Fe ₂ O ₃	4,70	4,20	11,80	11,20	11,00	13,80	9,30
MnO	0,04	0,13	0,30	0,17	0,02	0,06	0,02
MgO	0,60	0,50	1,80	1,90	3,30	2,80	1,60
CaO	0,60	0,40	1,10	1,20	2,50	2,80	1,90
Na ₂ O	0,50	(1,30)	(1,30)	(0,50)	--	--	--
K ₂ O	(1,10)	(0,50)	(1,90)	(1,60)	--	--	--
H ₂ O ⁺	6,10	1,80	4,00	13,40	7,80	9,20	8,40

Tabelle Nr. 4: Chemische Analysen einiger Tuffproben vom Steinbruch Oberwiddersheim.

Während alle Proben fast gleiche Zusammensetzung wie die Oeleberg-Analysen aufweisen, zeigt die umgelagerte Probe Nr. 39 in der Fraktion <0,6 μ m eine bemerkenswerte Anreicherung von Al₂O₃ bis 24 % und eine Abnahme im MgO- und CaO-Gehalt, was darauf hindeutet, daß diese Probe durch eine lateritische Verwitterung (Bodenbildung) verändert worden ist. Wegen der Überlagerung durch den Basalt dürfte diese Verwitterung schon im Tertiär erfolgt sein.

Die Tuffe von Staden (Bohrung 26, Probe Nr. 77).

Die Probe ist in 24 Meter Teufe aus einem dunkelgrauen Tuff-Horizont entnommen, der über Basalt abgelagert ist.

Korngrößenverteilung und Mineralbestand (vgl. Tab. 10):

Bei etwa 23 % Anteilen unter 6 μ m herrscht hier Kaolin vor, welcher über 65 % der gesamten Probe ausmacht. Andere Minerale sind Montmorillonit, Magnetit, Hämatit und Quarz. Das Kaolin-Mineral bildet hier sehr oft bis über 200 μ m große Aggregate (vgl. Seite 13).

Optik: Im Gegensatz zu den montmorillonitführenden Tuffen, wo alle Übergänge von zersetztem Glas zu Montmorillonit festgestellt werden konnten, ist in diesem Tuff anscheinend statt des Montmorillonits der Kaolin direkt aus Glas entstanden.

In den Korngrößen-Fractionen über 60 μ m findet man oft etwa rundliche braune Reste, die teilweise in Kaolin zersetzt sind. Der Kaolin mit einer mittleren Lichtbrechung um etwa 1,560 ist fast farblos und sehr fein kristallin. Pyroxene sind sehr selten in Glas eingeschlossen und dann immer frisch. In einigen Glasresten kommen völlig zersetzte Feldspatleisten vor.

In den Korngrößenklassen über 60 μ m sind die Fe-Oxide hauptsächlich Magnetit; nimmt sein Anteil mit abnehmender Korngröße ab, dann geht die dunkelgraue Farbe in eine sehr hellbraune Farbe über. Selten sind einige eckige Quarze und Calcit.

Die Ergebnisse einer chemischen Analyse sind in Tabelle 5 wiedergegeben.

	Probe Nr. 77	
SiO ₂	45,40	
TiO ₂	1,00	
Al ₂ O ₃	28,20	
Fe ₂ O ₃	10,40	
MnO	0,04	
MgO	1,10	
CaO	0,60	
Na ₂ O	--	
K ₂ O	--	
H ₂ O ⁺	13,30	
Summe	100,00	

Tabelle 5: Chemische Analyse der Tuffprobe Nr. 77 von Staden,
Fraktion $\leq 0,6 \mu$ m.

Diese Tuffe zeigen eine starke Anreicherung im Al_2O_3 -Gehalt, wenn man sie mit den Montmorillonit-Tuffen vergleicht. Nimmt man basaltisches Glas als die Ausgangssubstanz an - obwohl es kein frisches Glas in diesen Tuffen gibt -, dann ergibt sich, daß während der Zersetzung von Glas zu Kaolin eine starke Anreicherung an Al_2O_3 stattgefunden haben muß, während die Kationen Ca^{++} und Mg^{++} weitgehend weggeführt worden sind; es würde also ebenfalls wieder eine lateritische Verwitterung vorliegen.

4.7. Die Tuffe vom Steinbruch Traislumda:

Hier lagern 3 bis 4 Meter mächtige Tuffe (Probe Nr. 36 und 37) einem Basalt auf, die ihrerseits von einer etwa 2 Meter starken Lehmzone mit Quarzgeröllen überlagert werden (nicht näher untersucht).

Kornaufbau und Mineralbestand: Korngrößenverteilungs-Kurven sind in Abb. 17 dargestellt.




Abb. 17: Korngrößenverteilungs-Kurven der Tuffproben vom Steinbruch Traislumda.

Diese Tuffe sind durch einen sehr hohen Quarzgehalt bis 68 % charakterisiert. In Probe Nr. 36 ist Montmorillonit, ein unregelmäßiges Wechselagerungsmineral Montmorillonit-Illit, und wenig Illit und Kaolin vorhanden, während in Probe Nr. 37 stattdessen Kaolin mit wenig Montmorillonit und Illit auftritt, wobei alle Tonminerale auf die Fraktion unter 6 μm beschränkt bleiben. Sehr selten trifft man einige Pyroxene und Hornblende an, deren Eigenschaften nicht weiter untersucht wurden.

Die DTA-Kurven, die in Abb. 18 dargestellt sind, zeigen deutlich die Vorherrschaft von Quarz und seine Abnahme im Gehalt zugunsten des Tonmineralgehaltes mit abnehmender Korngröße.




Abb. 18: DTA-Kurven der Proben aus dem
Steinbruch Traislumda.

Röntgenographisch sind die auftretenden Kaolin-Interferenzen merkwürdig scharf im Vergleich zu den Interferenzen der Kaolin-Mineralen in Bohrung 26 (Probe Nr. 77).

4.8. Die Tuffe von Wohnbach (Bohrung 28, Probe Nr. 70 und 71).

Die exakte Lage der Tuffe und ihre Beziehung zum Basalt sind in Abb. 19 angegeben.



Abb. 19: Lage der Proben Nr. 70 und 71 im Profil der Bohrung 28 (Wohnbach).

Mineralbestand: Bemerkenswert sind die Unterschiede zwischen beiden Horizonten. Während die braunen Tuffe (Probe Nr 70) über 50 % Quarz, kein Karbonat und Montmorillonit als tonige Hauptkomponente enthalten, sind die grauen Schichten (Probe Nr 71) als Süßwasserkalk mit Tuffkomponente zu bezeichnen, da sie aus über 75 % Calcit, unter 10 % Dolomit, wenig Quarz, Montmorillonit, Kaolin und Illit bestehen.

Die DTA-Kurven sind in Abb. 20 dargestellt. Während die DTA-Kurven von Probe Nr. 70 deutlich die Reaktionen von Quarz und Montmorillonit zeigen, sind die von Nr. 71 über $6\mu\text{m}$ nur durch die Reaktionen der Karbonatminerale charakterisiert. Unter $6\mu\text{m}$ zeigen sie eine Abnahme der Karbonatminerale und eine Zunahme der Tonminerale mit abnehmender Korngröße.




Abb. 20: DTA-Kurven der Proben Nr. 70 und 71.

Optik: Der Montmorillonit (Probe Nr. 70) ist meist braun gefärbt mit nur etwa 5 % farblosen Körnern. Um einige Stellen findet man rotgefärbte Reste in farblosen Montmorillonit-Aggregaten, als ob der färbende Hämatit später weggelöst wäre. Fast frisches Glas mit mittlerer Lichtbrechung um 1,55 ist nur in Probe Nr. 71 vorhanden. Pyroxene fehlen mit Ausnahme einiger Mikrolithe in Glasanteil.

Dünnschliff (Probe Nr. 71): Interessant sind die zahlreichen Schnecken-Gehäuse in fein kristalliner, hauptsächlich calcitischer Grundmasse. Die Quarze, die in unregelmäßiger Verteilung in der Grundmasse vorkommen, mit Anreicherung in einigen Teilen, dienen zum Teil als Kern von Ooiden.

5. Zusammenfassung der Analyse des Stoffbestandes.

Nach der Korngrößenverteilung: (Tabelle S. 50/51)

Die Übersicht zeigt, daß fast alle Tuffproben aus einer unsortierten Masse von Aschen- und Staub-Tuffen bestehen, mit Ausnahme derjenigen vom Traislunda-Steinbruch, wo Quarzfragmente über 4 mm häufig sind. Sonst sind sie alle ähnlich, ohne eine Beschränkung einer besonderen Größenklasse auf ein besonderes Vorkommen.

Nach dem Mineralbestand:

Obwohl die Tuffe keine Gliederung nach magmatischen Komponenten zulassen, zeigen sie doch Unterschiede im Tonmineral-Gehalt. Es lassen sich unterscheiden:

1. Montmorillonit-führende Tuffe (bentonitisch), mit sehr wenig Illit, Chlorit und Kaolin. Zu dieser Gruppe gehören fast alle Vorkommen mit Ausnahme von etwa 4 % der untersuchten Proben.
2. Kaolin-reiche Tuffe (Gebiet von Hungen und Schotten) mit sehr wenig Montmorillonit und Illit. Hier handelt es sich ziemlich sicher um Produkte einer tertiären Verwitterung. Nach WIRTZ (1965) kann die tertiäre lateritische Verwitterung zum Teil in den oberen Horizonten der fossilen Bodenprofile bis zur Bildung von Gibbsit (Hydrargillit) führen; solche Proben sind in der vorliegenden Arbeit nicht angetroffen worden.
3. Tuffiger Kalkstein und Tuffe mit Kalkanteil.
 - a) Süßwasserkalke: über 80 % aus Calcit und Dolomit bestehend; der tuffige Charakter ist nur durch anwesendes Glas und zusätzlich etwas eckigem Quarz erkennbar.
 - b) Kalkige Tuffe: Sie gehören zum montmorillonit-führenden Typ mit sekundärem Calcit (vergl. 4.8.).

6. Zur Genese der untersuchten Tuffe des Vogelsbergs.

Zum Chemismus der tuffliefernden Basaltmagmen:

Die Frage nach dem chemischen oder petrographischen Typus des tuffliefernden Magmas zu behandeln, ist nur möglich unter Heranziehung des juvenilen (magmatischen) Anteils der Tuffe.

Der ehemalige Hauptanteil der Tuffe, das Glas, ist leider nur noch durch seltene Reste vertreten. Merkmale des alkali-basaltischen und des tholeiitischen Gesteintyps, wie Feldspatreichtum oder Pyroxenknäuel, sind in den juvenilen Anteilen nicht feststellbar. Die vereinzelt auftretenden Pyroxene und Feldspäte oder glasigen Reste erlauben nur den Schluß auf einen basaltischen Charakter des Ausgangsgesteins. Lediglich der Fund von Enstatit mit 5-10 % Fs-Anteil im Tuff von Oberwiddersheim spricht nach den Daten bei ERNST (1964) für eine Herkunft dieses Minerals aus Olivinknollen. Da solche Knollen an Alkalibasalte gebunden sind, würde danach für den Tuff von Oberwiddersheim ein alkali-basaltisches Ausgangsmagma zu vermuten sein. Eine engere Zuordnung der Tuffe zu den verschiedenen Ergusdecken ist auf der Basis dieser Untersuchungen nicht möglich.

Aufgrund der chemischen Analysen und der mineralogischen Ergebnisse beläuft sich der Kieselsäuregehalt der Tuffe wasserfrei berechnet auf etwa 53-57 % (nach Abrechnung von Fremd-Quarz), besonders in den kleineren Fraktionen, die fast ausschließlich aus Montmorillonit bestehen. Der SiO_2 -Gehalt des entwässerten Montmorillonits entspricht damit etwa dem eines tholeiitischen Basaltes ("Trapp"). Bei den übrigen Oxiden liegen besonders die Gehalte an Erdalkalien und Alkalien niedriger als im Basalt.

Es ist jedoch sicher, daß man nicht für alle Tuffe ein einheitliches Ausgangsmagma annehmen kann. WIRTZ (1965) hat kürzlich auf S. 32-33 seiner Dissertation quantitative Angaben über den Schwermineralbestand der Sandfraktion der von ihm untersuchten Proben aus fossilen Böden im Vogelsberg gemacht. Da nach seinen Angaben die Bodenprofile alle aus Lockermaterial, vorwiegend Tuffen, entstanden sind, geben die Schwerminerale wichtige Hinweise auf die Ausgangskomponenten. Danach dürfte etwa in seinem Profil I (mit sehr viel Augit sowie Hypersthen und außerdem Feldspat) vermutlich tholeiitisches Magma vorgeherrscht haben, im Profil IX dagegen (mit viel Enstatit und Titanaugit) alkalibasaltisches Magma. Daneben dürfte aber auch - wie die zum Teil hohen Gehalte an Sphen (Titanit),

Zirkon, Rutil und lokal sogar Turmalin zeigen - Material aus granitischem oder metamorphem Fremdmaterial aufgenommen worden sein (vergl. nächsten Abschnitt).

6.2. Zur Frage der Herkunft der Fremdkomponenten.

Der Hauptanteil der Fremdkomponenten ist Quarz, der in fast allen Tuffen vorhanden ist. Einige Vorkommen, insbesondere die Proben Nr. 36 und 37 mit über 65 % und Nr. 39 mit etwa 50 %, weisen einen erstaunlich grossen Anteil an allothigenem Quarz auf. Sonst bleibt in den anderen Proben der Quarzgehalt meist unter 20 %. Die Körner sind meist von eckiger, seltener von subangularer Gestalt. Spezifische Korrosionsoberflächen oder Reaktionsränder sind sehr selten. Auch in der Farbe gibt es keine regionalen Unterschiede. Die Quarze sind meist weißgrau bis hellgrau und frei von Einschlüssen.

Der im Untergrund anstehende Buntsandstein erscheint als Lieferant des Quarzanteils weniger wahrscheinlich als das Tertiär, weil in den Tuffen kein Orthoklas oder Oligoklas feststellbar ist. Allerdings reicht die Kaolinisierung im liegenden Buntsandstein bis in mindestens 120 m Tiefe unter dessen Oberfläche hinab (frdl. mdl. Mitt. von Herrn Dr. Schenk). Buntsandstein weist nach VALETON (1953) und SCHNITZER (1957) 15-20 % Orthoklas und Oligoklas auf. Einige Buntsandstein-Proben aus einer Bohrung bei Wallerhausen (bei Nidda) wurden in dieser Arbeit zum Vergleich untersucht. Neben Quarz als Hauptkomponente bestehen sie aus etwa 15 % von sehr stark kaolinisierten Feldspäten, die sich mit den Fingern leicht zerdrücken lassen. Allenfalls kommt demnach verwitterter Buntsandstein als Lieferant in Frage.

Die in den Tuffen auftretenden Feldspäte sind dagegen Andesin bis Labrador mit 50⁺₅ % Anorthit und treten in frischen, idiomorphen Individuen auf. Ihr Vorkommen in größerer Menge ist stets verknüpft mit dem Auftreten von Pyroxenen und meist mit dem von Lapilli, was zu dem Schluß führt, daß die in den Tuffen vorkommenden Feldspäte vulkanischer Herkunft sind. Authigene Feldspatbildung oder Umbildung der Plagioklasse im Tuff sind mit Sicherheit auszuschließen.

Nach SCHENK (frdl. mündl. Mittl.) liegen mächtige tertiäre Lockersedimente unter den Vogelsberg-Basalten. Sie haben eine maximale Mächtigkeit von etwa 150 m im Westen des Vogelsbergs, die zum Zentralgebiet abnimmt und gegen Osten wieder etwas anschwillt. Die untersuchten Tertiär-

sand-Proben aus Bohrung Nr. 1 (Khoden) bestehen hauptsächlich aus weiß- bis hellgrauen Quarzkörnchen und enthalten fast keine Feldspäte.

Es ist deshalb wahrscheinlicher, daß der Quarzanteil der Tuffe wesentlich aus tertiären Lockersedimenten stammt. Ein sicherer Schluß ist jedoch nicht möglich; außerdem dürfte das Tertiär ohnehin weitgehend umgelagerten Buntsandstein darstellen. Sonst sind die Fremdkomponenten neben Quarz praktisch nur basaltische Bruchstücke (siehe Seite 7 und 8).

Zur Umwandlung der primären Tuffkomponenten.

1. Die hydrothermale Fazies: Montmorillonit-Tuffe.

Es kann kein Zweifel bestehen, daß der Montmorillonit in den bentonitischen Tuffen aus glasigen Lockerprodukten entstanden ist. In den meisten Proben liegen alle Übergänge von Montmorillonit-Aggregaten zu vulkanischen, basaltischen Glasresten vor. Sehr häufig findet man deutliche sphärolithische Texturen und mit Montmorillonit gefüllte Blasen.

Der größte Teil des Montmorillonits dürfte nach den Beobachtungen von SCHENK (1964) in einer hydrothermalen Spätphase des Vulkanismus und nicht erst durch Verwitterung oder Umbildung aus anderen Tonmineralen entstanden sein. Seine Anwesenheit in Blasen und Rissfüllungen deutet aber auch auf spätere Wanderungen.

2. Kaolinbildung (Zur Frage der Lateritisierung).

In verschiedenen untersuchten Tuffproben kommen auch Kaolin-Mineralen vor, und zwar in Mengen von unter 5 % bis zu rund 65 %. Kaolinreiche Proben ähnlicher mineralogischer Zusammensetzung hat WIRTZ (1965) aus dem Vogelsberg beschrieben. Danach liegt die Vermutung nahe, daß es sich bei den kaolin-führenden Proben um fossile Böden mit Tendenz zur Lateritisierung handelt. Die von WIRTZ (1965) analysierten "Latosols" des Vogelsberges zeigen bei hohem Montmorillonit-Gehalt $\text{SiO}_2:\text{Al}_2\text{O}_3$ -Verhältnisse von etwa 4,0 bis 5,8, bei hohem Kaolingehalt um 2,0 und schließlich bei wesentlichen Gehalten an Gibbsit (Hydrargillit) Verhältnisse von um 0,3 bis 1,1. Es läßt sich hier also mineralogisch eine Reihe abnehmender SiO_2 -Gehalte aufstellen.

Für die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Tuffproben ergeben sich ganz analoge chemische Verhältnisse entsprechend dem Mineralbestand:

Tabelle Nr. 5a: Oxidverhältnisse ausgewählter Proben <0,6 um (vergl. Text)

Nr. der Probe	41	59	56	39	77
$\frac{\text{SiO}_2}{\text{Al}_2\text{O}_3}$	6,60	5,90	5,70	2,89	2,74
$\frac{\text{SiO}_2}{\text{Fe}_2\text{O}_3}$	13,30	9,90	5,60	10,70	11,60
$\frac{\text{Al}_2\text{O}_3}{\text{Fe}_2\text{O}_3}$	2,00	1,60	0,90	1,70	4,24

Von diesen Proben führen Nr. 41 und 59 fast nur Montmorillonit, während Nr. 56 und 39 auch geringe und Nr. 77 große Mengen von Kaolin-Mineralen enthalten. Gegenüber dem tuffigen Ausgangsmaterial sind in den ersten Stadien (Montmorillonitbildung, siehe voriger Abschnitt) schon fast alle Alkalien und ein großer Teil der Erdalkalien verloren gegangen; bei der beginnenden Lateritisierung wird dann SiO_2 und auffallenderweise auch Fe_2O_3 weggeführt (siehe zweite Reihe der Tabelle 5a, ganz analog den von WIRTZ (1965) beschriebenen Verhältnissen). Das Endstadium der Gibbsite-Bildung ist in den hier untersuchten Proben nicht erreicht worden.

Die Ergebnisse stimmen also im wesentlichen mit denen von WIRTZ (1965) überein, der die fossilen (tertiären) Bodenbildungen untersuchte. Nach SCHEINK (1965) kommt im Vogelsberg eine Vielzahl von Lateritdecken wechselnd mit den Basalten vor; nach WIRTZ entstehen die lateritischen Böden dabei fast ausschließlich aus Lockermaterial, meist Tuffen, und zwar jeweils vor der Ablagerung der überlagernden Basalte, also sicher intra-tertiär. Von WIRTZ (1965) wird die Ausfüllung von Rissen und Hohlräumen in den "Latosols" mit Montmorillonit auf eine Einwirkung der überlagernden jüngeren Basalte zurückgeführt. Dies wäre nach den eigenen Beobachtungen durchaus möglich.

Dagegen kann der Annahme von WIRTZ (1965), daß die von ihm untersuchten Böden aus praktisch unzersetzten basaltischen Tuffen entstanden wären, nicht allgemein zugestimmt werden. Es wurde vielmehr des öfteren festgestellt, daß aus dem basaltischen Glas eindeutig Montmorillonit hervorgeht. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, daß die fossilen Böden aus schon weitgehend zu Montmorillonit zersetzten Tuffen gebildet worden sind. Eine Bildung von Kaolin-Mineralen direkt aus Glas, wie sie für

Probe Nr. 77 der vorliegenden Arbeit angenommen wurde, dürfte dagegen zurücktreten.

Interessant ist auch das Auftreten von Metahalloysit bzw. Fireclay-Mineral im Hinblick auf die Feststellung von KÖSTER (1955), daß Kaolin im Laterit-Profil nicht stabil ist; die Bildung der Kaolin-Mineralen dürfte also auch im Vogelsberg nur ein Zwischenstadium auf dem Wege zu einer völligen Lateritisierung darstellen, die wohl oft durch neue Ergüsse unterbrochen worden ist.

Im einzelnen werden allerdings die Umwandlungsvorgänge sicher oft komplizierter gewesen sein. So deutet in einigen Fällen der Fund von Breccien mit kaolinisierten Feldspäten in den basaltischen Komponenten, eingeschlossen in eine montmorillonitreiche Grundmasse, darauf hin, daß bereits zersetzte (lateritisierte) Basalte als Ausgangsmaterial für diese Komponenten in den Tuffen gedient haben. Im Einzelfall hat sicher die Durchlässigkeit für Verwitterungslösungen eine entscheidende Rolle gespielt.

Allgemein fällt beim Studium der Verwitterung im Vogelsberg auf, daß das Eisen nicht direkt mit dem Aluminium relativ angereichert worden ist. SCHELLMANN (1964) sprach deshalb von einem vom Normalfall abweichenden Typ lateritischer Verwitterung. Nach ihm ist das Eisen im wesentlichen auf Klüften und Absonderungsflächen im kaolinisierten Basaltzersatz konzentriert.

3.3. Weitere Tonminerale in den Tuffen.

Neben Montmorillonit und Kaolin-Mineralen wurden in geringer Menge auch Minerale der Chlorit-Gruppe und Illit in den untersuchten Tuffen gefunden.

Das Vorkommen von Chlorit ist meistens auf die Fraktion $< 6 \mu\text{m}$ beschränkt. Nur in einigen Fällen kommen größere Chlorite (nach der Optik Prächlorit und Pennin) vor, nämlich um Quarzkörner herum (wahrscheinlich als Umbildung von Pyroxen-Reaktionsrinden um Quarz) oder als Rißfüllungen in einer Montmorillonit-Grundmasse. Im letzteren Fall müssen sie nach der Montmorillonit-Bildung unter Mitwirkung von Mg-Fe⁺⁺-haltigen Lösungen entstanden sein. Da die 14 Å-Linie bei Erhitzen auf 450°C verschwindet, hat die thermische Stabilität Ähnlichkeit mit der der Chlorit-Neubildungen in Sedimenten, die dort nach GRIM und JOHN (1953) diagenetisch entstanden sein dürften.

Illit kommt nur in sehr kleinen Mengen und nur in den Fraktionen $< 6 \mu\text{m}$ vor. Es ist möglich, daß dieser sekundär aus Montmorillonit [GRIM (1953)] oder aus Kaolin [WEAVER (1959)] gebildet worden ist, doch sind auch andere Entstehungsweisen denkbar [v. ENGLHARDT (1962)]. Eine Entscheidung ist hier nicht möglich.

6.3.4. Zur Farbe der untersuchten Tuffe.

Häufig sind Farbunterschiede zwischen den verschiedenen Tuffproben festzustellen, meistens von hell- oder dunkelgrau bis braun.

Die hellgrauen und dunkelbraunen Tuffe zeigen keine qualitativen ton-mineralogischen Unterschiede. Qualitativ ist neben dem überwiegenden Montmorillonit in fast allen Proben sehr wenig Kaolin und Illit vorhanden. Alle diese Proben sind stets reich an Hämatit, der optisch und röntgenographisch in den Fraktionen $< 6 \mu\text{m}$ nachweisbar war. Die Variationen in der Intensität der Färbung werden hier durch unterschiedlichen Hämatit-Gehalt verursacht.

In einigen Fällen, z.B. in kaolinführenden Vorkommen, rührt die dunkelgraue Farbe sicher vom Auftreten größerer Mengen von Magnetit her. Den Farbeffekt des Magnetits und den Wechsel von dunkelgrauen zu hellbraunen Farben findet man schon in den getrennten Fraktionen demonstriert, wo der Magnetit-Gehalt von über 15 % in der Korngrößenklasse 60-20 μm auf unter 7 % in der Fraktion 6-2 μm absinkt (Probe Nr. 77).

7. Zusammenfassung.

Tuffe des Vogelsbergs aus verschiedenen Vorkommen wurden mit sedimentpetrographischen Methoden untersucht und ihr Mineralbestand quantitativ bestimmt.

Obwohl die Tuffe keine Gliederungsmöglichkeit nach magmatischen Komponenten zuließen, zeigten sich doch zum Teil deutliche Unterschiede im Tonmineralbestand. Danach ergaben sich je nach Mineralbestand und Bildungsbedingungen drei verschiedene Typen:

1. Tuffe mit Montmorillonit-Vormacht und sehr wenig Illit, Chlorit und Kaolin. Sie sind durch hydrothermale Umbildung aus magmatischen Tuffkomponenten entstanden; zum Teil ist noch erkennbar, daß der Montmorillonit aus vulkanischen Glasresten gebildet worden ist.
2. Tuffe mit Kaolin-Vormacht und wenig Montmorillonit und Illit. Sie werden in Anlehnung an die bodenkundliche Arbeit von WIRTZ (1965) als Produkte einer teilweisen Lateritisierung der Tuffe bei intra-tertiärer Verwitterung in den Ruhephasen des Vulkanismus gedeutet. In den obersten Bodenhorizonten kommt nach WIRTZ (1965) teilweise sogar Gibbsit vor.
5. Tuffe mit wesentlichem Kalk-Gehalt. Hier handelt es sich um Süßwassertuffe mit Montmorillonit-Gehalten oder um montmorillonit-führende Tuffe mit sekundärem Calcit.

Als Fremdkomponenten kommen neben basaltischen Lapilli und magmatischen Mineralen fast nur Quarze vor, die im wesentlichen aus unterlagernden Tertiärsanden stammen dürften. Das Ausgangsmagma ist nicht mehr mit Sicherheit zu rekonstruieren; in einzelnen Fällen dürfte alkalibasaltisches, in anderen tholeiitisches Magma vorgelegen haben.

Schließlich wurden die thermischen Eigenschaften des Montmorillonits in Abhängigkeit vom Mg-Gehalt untersucht.

Herrn Prof. Dr. Th. Ernst, meinem sehr verehrten Lehrer, auf dessen Anregung und unter dessen Betreuung und Leitung diese Arbeit durchgeführt wurden, bin ich zu tiefstem Dank verpflichtet. Ohne sein stetes Interesse, mannigfache Unterstützung und sehr wertvollen Ratschläge wäre die Arbeit nicht zustande gekommen.

Ebenso danke ich besonders sehr herzlich Herrn Univ.-Doz. Dr. K. v. Gehlen für sehr wertvolle Ratschläge und Unterstützung bei dieser Untersuchung.

Für die sprachliche Korrektur und mannigfache Unterstützung, die mir die Bearbeitung erleichterten, danke ich Herrn Dr. W. Bausch sehr herzlich.

Herrn Dr. E. Schenk (Geologische Forschungsstelle Hungen, Gießen) danke ich ebenfalls sehr herzlich für wertvolle Hinweise über die geologische Lage der Tuffe und für die große Hilfe während der Entnahme von Proben.

Herrn Dr. K. Schüller (Fa. Stemag, Lauf/Pegnitz) danke ich vielmals für die elektronenmikroskopischen Aufnahmen.

Weiterhin danke ich sehr herzlich Herrn Dr. A. Becher für seine Hilfe bei der Einweisung in den Gebrauch der Geräte.

8. Literaturverzeichnis

- HAD, I.: Vermiculite and its relation to biotite, as revealed by base exchange reactions, x-ray analysis, differential thermal curves and water content. Amer. Miner. 33, 1948, 655-678.
- : The effect of the interlayer cations on the expansion of the micatype of crystal lattice. Amer. Min. 35, 1950, 225-238.
- ER, A.: Eine Tonmineralfolge vom Beckenrand zum Beckeninnern im Buntsandstein Nordost-Bayerns. - Diss. Univ. Erlangen, 1965, (Maschinenschrift).
- DLEY, G.W. u. Mitarbeiter: X-ray identification and crystal structures of clay minerals. Min. Soc. London, 1951.
- ZZI, A.V.: Microscopic sedimentary petrography. New York, London, 1960.
- ENS, C.W.: Die Entstehung der Gesteine (in Barth-Correns-Eskola). Berlin, Springer-Verlag, 1933.
- u. SCHOTT, W.: Vergleichende Untersuchungen über Schlämm- und Aufbereitungsverfahren von Tonen. Kolloid. Z. 61, 1932, 68-80.
- EY, J.W., MILNE, I.H. u. MC VEAH: Thermal dehydration and x-ray studies on montmorillonite. Amer. Min. 38, 1953, 770-788.
- MANN, C.H. u. FAVEJEE, J.C.L.: On the crystalstructure of montmorillonite and halloysite. Z. Krist. 102-A, 1940, 417-431.
- ELHARDT, W.V.: Neuere Ergebnisse der Tonmineralforschung. Geol Rdsch. 51, 2, Stuttgart, 1962, 457-477.
- T, Th.: Peridotitic Inclusions in Basalts as Mantle Material. Vortrag XXII Internat. Geol. Congress, New Delhi, 1964.
- EL, W.: Qualitative und quantitative Untersuchungen an Dilatometerkurven von Tonen. Heidelbg. Beitr. Min. u. Petr. 5, 1956-57, 1-22.
- M, R.E.: Concept of Diagenesis in Argillaceous Sediments. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 42, 1958, 246-253.
- u. JOHN, D.W.: Claymineral investigation of sediments in the northern Gulf of Mexiko. Proc. Sec. Nat. Conf. on Clay and Clay minerals. 1953, 81-103.
- ERASSOWITZ, H.: Laterite, Fortschr. Geologie u. Paläntologie. Bd. 4, H. 14, 1926.
- UND, K.: Eine Texturkamera zur schnellen Bestimmung von blättchenförmigen Tonmineralien. Naturwiss. 43, 12, 1956, 275.
- J, M.: Beiträge zur Theorie und Praxis der mechanischen Bodenanalyse. Landwirtschaft. Jb. 67, H. 4, 1928, Berlin.
- ER, H.M.: Beitrag zur Kenntnis indischer Laterite. Heidelbg. Beitr. Min. Petr. 5, 1956-1957.
- TM, H.H.: Mineralbestand und Genese fränkischer Keuper- und Lias-Tone. - Diss. T.H. München 1961 (Maschinenschrift).
- ENZIE, R.C.: Differential thermal investigation of clays. Min. Soc. London 1957.
- CONNEL, D.: The crystal chemistry of montmorillonite. Amer. Mineral 35, 1950, 166-172.

- MILNE, I.H. u. EARLY, J.W.: Effect of source and environment on clay minerals and argillaceous and siliceous neoformations. - Clay and Clay-minerals, 10, 1963, 399-412.
- NAGELSCHMIDT, G.: X-ray investigation of clays. Part III. Z. Krist. 97, 1937, 514-521.
- PAGE, J.W.: DTA of montmorillonite. Soil. Sci. London, 56, 1943, 273-283.
- PILLER, H.: Die Phasenkontrastmikroskopie als Hilfsmittel zur Bestimmung feinkörniger, speziell dünner, transparenter Minerale. Heidelbg. Beitr. Min. Petr. 3, 1953.
- SHELLMANN, W.: Die lateritische Basaltverwitterung im Vogelsberg und in den Tropen. - Vortrags-Ref. Fortschr. 42, 1965.
- SCHENK, E.: Die geologischen Erscheinungen der Subfusion der Basalte. Heft 46, 1964, Hessisches Landesamt für Bodenforschung, Wiesbaden.
- Zur Entwicklung der Basalteisensteinlagerstätten im Vogelsberg (Hessen) in Pleistozän aus den Lateritdecken des Tertiärs. Vortrags-Ref. Geol. Vereinigung Straßburg, 1965.
- SCHNITZER, W.A.: Die Lithologie und Paleogeographie des Buntsandsteins am Westrand der Böhmisches Masse. Erlanger geol. Abh., Erlangen 24, 1957, S. 130.
- SCHOTTLER, W.: Der Vogelsberg - sein Untergrund und Oberbau. Braunschweig 1920.
- Erläuterungen zur Geologischen Karte von Hessen im Maßstab 1:25.000 - Blatt Hungen. Darmstadt 1921.
- Erläuterungen zur Geologischen Karte von Hessen im Maßstab 1:25.000. Blätter Nidda u. Schotten. Darmstadt 1924.
- TRÖGER, W.E.: Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale. Teil 1. Bestimmungstabellen. 3, 1959, Aust. Stuttgart, Schweizerbart.
- VALETON, I.: Petrographie des süddeutschen Hauptbuntsandsteins. Heidelbg. Beitr. Min. Petr. 3, 1953, 335-379.
- WEAVER, C.E.: The distribution and identification of mixed layer clays in sedimentary rocks. Amer. Min. 41, 1956, 202-221.
- Geological interpretation of argillaceous sediments. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 42, 2, 1958, 254-271.
- The clay petrology of the sediments. - Clays and Clay minerals. London, New York, Paris, Los Angeles, 1949, 154-157.
- WILLIAMS, O.G.: The relation of the physical properties of natural glasses to their chemical composition. J. Geol. 32, 1924, 353-372.
- WIRTZ, R.: Beitrag zu der Kenntnis der Paläosole in dem Vogelsberg, W. Deutschland. Diss. Univ. Utrecht, Holland. 1965 (Maschinenschrift).

A N H A N G

Tabelle Nr. 6

Verzeichnis der Fundpunkte bzw.
(Z.O.V. = Zerspreibrand
katalysierten von Tuffproben.
Oberflächliche Verzorgungsstücke)

Probe Nr.	Ort - Benennung	Topo. Karte 1:25000		Altäreite		Höhe in m über NN	Aussehen und Eigenschaften
		Name	Nr.	rechts	hoch		
1-33	Steinbruch am Orlaberg	Gleiden	9418	34.05-72	56.06.58	220.00	siehe Tabelle Nr. 7
34	" bei Großbunzack	Allendorf	5338	34.05-17	56.08.62	220.00	grau, mittelkörnig.
35	Strangenschnitt bei Großbunzack	"	"	34.05.24	56.09.18	235.00	hellbraun, feinkörnig, geschichtet.
36	Steinbruch zwischen Traile und Allendorf	"	"	34.05.74	56.15.40	210.00	weiß, mittelkörnig.
37	" " " "	"	"	"	"	"	grau, mittelkörnig.
38	Glühbach "Agla Born"	"	"	34.06.64	56.13.70	280.00	grau, grobkörnig, geschichtet.
39	Steinbruch Oberdiersheim	Burglen	5519	34.95.76	55.08.14	175.00	dunkelbraun, mittelkörnig, porös.
40	" " " "	"	"	"	"	"	hellgrau, feinkörnig, geschichtet.
41	" " " "	"	"	"	"	"	graugrün, feinkörnig.
42	" " " "	"	"	"	"	"	braun, feinkörnig, geschichtet.
43	" " " "	"	"	"	"	"	hellgrau, feinkörnig.
44	Bohrung des Z.O.V. Nr. 5 (41.8-44.6 m)	"	"	34.91.10	55.94.47	150.00	hellgrau, feinkörnig.
45	" " " " 41 (8.2 m)	"	"	34.93.61	55.91.42	135.70	violettbraun, feinkörnig.
46	" " " " 24 (15-24.1 m)	"	"	34.97.03	55.06.76	161.00	hellbraun, mittelkörnig.
47	" " " " 8 (26.6-30 m)	"	"	34.96.73	55.94.95	175.00	ockerfarben, feinkörnig.
48	" " " " 2 (20.15 m)	"	"	34.90.44	55.93.30	157.70	zitgelrot, mittelkörnig.
49	" " " " Kölden I (150.5-153.9 m)	Middle	5520	35.01.62	55.08.51	134.00	hellgrau, grobkörnig, geschichtet.
50	" " " " (153.9-154 m)	"	"	"	"	"	hellgrau, grobkörnig, geschichtet.
51	" " " " (155-160.8 m)	"	"	"	"	"	hellgrau, feinkörnig.
52	" " " " Nr. 10 (6.50-7.15 m)	"	"	35.07.032	55.93.897	222.68	braun, feinkörnig.
53	" " " " 11 (22-22.95 m)	"	"	35.06.974	55.94.004	238.80	gelbbraun, feinkörnig.
54	" " " " 15 (26.25-40.27 m)	"	"	35.06.938	55.93.785	211.57	braun, feinkörnig.
55	" " " " Retard I (52.7-55 m)	"	"	35.06.18	55.93.20	195.00	ziegelrot mit kleinen gelben v. schwarzen Punkten
56	" " " " (70-78 m)	"	"	"	"	"	gelbbraun, feinkörnig.
57	" " " " (186.5-188.3 m)	"	"	"	"	"	gelbbraun mit brecciolen Komponenten.
58	" " " " (200.3-201.1 m)	"	"	"	"	"	dunkelrot, feinkörnig.
59	" " " " (309-311 m)	"	"	"	"	"	dunkelgrau, grobkörnig.
60	" " " " (316.5-322.2 m)	"	"	"	"	"	grau, feinkörnig, geschichtet.
61	Oberflächen - Middle	"	"	35.02.30	55.90.60	205.00	rotbraun, mittelkörnig.
62	Oberfläche, Anschluss an der Straße am Ortand	"	"	35.06.86	55.87.28	205.00	braun, feinkörnig.
63	Steinbruch in Michelau	"	"	35.02.86	55.87.32	205.00	braun, feinkörnig, geschichtet.

Probe Nr.	Ort - Benennung	Topo.Karte 1:25000		Gitterwerte		Höhe in m über NN	Aussehen und Eigenschaften
		Name	Nr.	rechts	hoch		
64	Lauterbach - Straßeneinschnitt zwischen Stadtrand und Balkkreuzung	Lauterbach	- 5322	35.27.72	56.11.90	310.00	violettgrau, feinkörnig.
65	Autobahn bei Basisküste Reinaldshain	Londorf	- 5319	34.93.00	56.09.92	325.00	rotbraun, feinkörnig.
66	Bohrung des Z.O.V. Nr. 4 (36.5-36.8 m)	Leubach	- 5419	34.90.27	55.96.98	130.30	hellgraugelb, feinkörnig, geschichtet.
67	Schotten an der Straße nach Gadem zwischen beiden Steinbrüchen	Schotten	- 5420	35.09.50	55.95.98	320.00	rotbraun, mittelkörnig.
68	Bohrung des Z.O.V. Nr. 12 (6.3-6.5 m)	"	- "	35.02.60	56.00.00	229.60	hellbraun, feinkörnig.
69	" " " " 3 (10-11.6 m)	Butzbach	- 5518	34.86.77	55.93.31	161.30	gelbgrau, feinkörnig.
70	" " " " 28 (33.4-33.6 m)	"	- "	34.86.64	55.88.80	201.60	ziegelrot, feinkörnig.
71	" " " " (56-57.7 m)	"	- "	"	"	"	hellgrau, feinkörnig.
72	Steinbruch Niederohren	Burgemünden	- 5320	35.02.36	56.13.62	290.00	braun, feinkörnig.
73	Steinbruch Oberohren	"	- "	35.07.36	56.08.96	345.00	braun, feinkörnig.
74	Totenkapelle südlich von Meiches	Storndorf	- 5321	35.18.48	56.08.66	555.00	gelbbraun, feinkörnig.
75	Herbstein, oberer Steinbruch am Callberg	Herbstein	- 5422	35.24.20	56.02.04	450.00	gelbbraun, feinkörnig.
76	" " " (Kontakt Basalt/Tuffe)	"	- "	"	"	"	violettbraun, feinkörnig.
77	Bohrung des Z.O.V. Nr. 26 (24.0-25.0 m)	Staden	- 5619	34.93.18	55.83.59	132.00	dunkelgrau, mittelkörnig.

Tabelle Nr. 7

Verzeichnis der Proben vom Steinbruch Oeleberg (lfd. Nr. 1-33)

Alle Proben sind aus dem Steinbruch am Oeleberg bei Großenbuseck östlich von Gießen aus zwei Profilen entnommen. Die angegebenen Höhen gelten von der Steinbruchsohle aus.

Probe Nr.	Höhe (cm)	Aussehen und Eigenschaften
<u>Profil Nr. 1</u>		
1	0- 25	hellgraugrün, feinkörnig, geschichtet.
2	25- 45	graubraun, mittelkörnig.
3	45- 75	gelbbraun, mittelkörnig.
4	75-115	graubraun, mittelkörnig.
5	115-155	graubraun, mittelkörnig, porös.
6	155-175	gelbgrün, feinkörnig.
7	175-225	graugrün, feinkörnig.
8	225-320	graubraun, feinkörnig, geschichtet.
9	320-340	graugrün, feinkörnig, fettig.
10	340-380	graugrün, feinkörnig.
11	380-385	graugrün, feinkörnig, geschichtet.
12	385-565	graugrün, feinkörnig, fettig.
13	565-605	rotbraun, feinkörnig.
14	605-665	graubraun, feinkörnig.
<u>Profil Nr. 2</u>		
15	0- 60	gelbbraun, mittelkörnig.
16	60- 70	graubraun, mittel- und feinkörnig, geschichtet.
17	70- 76	graugrün, mittel- und feinkörnig, geschichtet.
18	76-106	graubraun, mittel- und feinkörnig, geschichtet.
19	106-118	grau, feinkörnig.
20	118-143	graugelbbraun, fein- und mittelkörnig, geschichtet.
21	143-153	graubraun, fein- und mittelkörnig, geschichtet.
22	153-163	gelblichbraun, feinkörnig.
23	163-168	graubraun, feinkörnig, geschichtet.
24	168-320	gelbbraun, mittelkörnig.
25	320-370	grünlichgrau, feinkörnig.
26	370-460	dunkelbraun, feinkörnig.

Tabelle Nr. 7

(Fortsetzung)

Probe Nr.	Höhe (cm)	Aussehen und Eigenschaften
<u>Mitte des Steinbruchs</u>		
27	160-200	gelbgrün, mittelkörnig.
28	140-160	grünlichbraun, feinkörnig.
29	0-140	graubraun, feinkörnig.
<u>Westliche Seite des Steinbruchs</u>		
30	Mitte-Wand	graugrün, feinkörnig.
<u>Kontaktzone (Basalt/Tuffe), Mitte des Steinbruchs</u>		
31	Kontaktzone	dunkelviolettbraun, feinkörnig.
32	50 cm unterhalb Kontakt	hellgrau, feinkörnig.
33	200 cm unterh. Kontakt	hellbraun, mittelkörnig, geschichtet.

Tabelle Nr. 8

Korngrößenverteilung der Tuff-Proben aus dem Oeleberg-Steinbruch

(in Gewichts-%)

Probe	Korngröße in μ m									Gesamt
Nr.	>1000	1000-632	632-200	200-63	63-20	20-6	6-2	2-0.6	<0.6	%
					<u>Profil 1</u>					
1	0.25	0.25	12.00	27.00	27.00	7.00	11.00	10.00	5.00	99.50
3	0.43	0.22	46.00	19.00	9.00	8.00	5.00	7.00	6.00	100.65
5	0.13	0.19	26.00	28.00	10.00	10.00	7.00	8.00	11.00	100.32
8	0.01	0.05	5.00	30.00	22.00	17.00	10.00	11.00	5.00	100.06
9	-	0.02	2.00	9.00	12.00	16.00	16.00	26.00	19.00	100.02
10	-	-	1.00	21.00	18.00	22.00	14.50	12.00	12.00	100.50
12	-	0.04	5.00	32.00	16.00	17.00	10.00	9.00	10.00	99.04
13	0.05	0.57	4.00	33.00	13.00	16.00	13.00	9.50	11.50	100.62
14	0.10	0.10	2.00	15.00	22.00	21.00	16.00	12.00	12.00	100.20
					<u>Profil 2</u>					
15	0.30	0.19	15.00	34.00	18.00	7.00	5.00	5.00	15.00	99.49
17	0.12	0.50	6.00	34.00	14.00	16.00	11.00	8.00	10.00	99.62
19	-	0.03	7.00	33.00	18.00	12.00	9.00	8.00	13.00	100.03
21	0.18	0.33	16.00	28.00	20.00	12.00	10.00	4.80	8.60	99.91
24	0.08	0.23	15.41	31.31	14.50	11.30	7.80	5.90	16.00	100.53
26	0.08	0.37	8.60	14.40	19.00	16.80	10.40	1.20	16.80	100.65
					<u>Mitte des Steinbruchs</u>					
27	2.52	2.54	43.64	17.55	7.00	9.00	6.00	4.00	6.00	100.25
28	0.08	0.26	3.00	47.00	14.00	11.00	14.00	7.00	4.00	100.34
29	0.08	0.18	29.00	21.00	10.00	10.00	12.00	6.00	12.00	100.26
					<u>Westliche Seite</u>					
30	-	-	3.47	22.14	16.40	21.80	14.00	9.00	13.80	100.61

Tabelle Nr. 9

Korngrößenverteilung der Tuff-Proben (außer Oeleberg)
(in Gewichts-%)

Probe Nr.	Korngröße in μm									Gesamt %
	>1000	1000-632	632-200	200-63	63-20	20-6	6-2	2-0.6	<0.6	
36	0.01	0.03	5.00	39.00	17.00	15.00	10.00	11.00	3.00	100.04
37	8.00	1.00	6.00	9.00	16.40	20.80	19.00	14.00	6.00	100.12
39	-	0.18	32.00	24.00	11.00	8.00	7.00	7.00	11.00	100.18
40	0.12	0.13	19.00	13.00	12.00	14.00	10.00	11.00	21.00	100.25
41	-	-	1.00	28.00	10.00	11.00	10.00	12.00	28.00	100.00
42	-	0.12	30.00	12.00	16.00	15.00	10.00	6.00	11.00	100.12
43	0.05	0.21	6.00	22.00	15.00	16.00	14.00	10.00	17.00	100.26
45	0.10	0.30	6.00	32.00	15.00	12.00	10.00	19.00	16.00	100.40
46	1.00	0.60	30.00	19.00	11.00	13.00	8.00	7.00	10.00	99.60
47	-	0.20	12.00	38.00	12.00	13.00	16.00	8.00	1.00	100.20
48	-	0.10	18.00	35.00	8.00	7.00	10.00	11.00	11.00	100.50
49	-	0.10	8.00	34.00	18.00	15.00	14.00	5.00	6.00	100.10
50	1.02	2.00	24.00	27.00	15.00	10.00	8.00	7.00	6.00	100.02
51	-	0.20	3.00	13.00	7.00	12.00	13.00	17.00	35.00	100.20
57	0.14	0.30	30.00	26.00	11.00	11.00	6.00	4.00	11.00	99.44
59	-	0.10	7.00	33.00	15.00	16.00	11.00	9.00	9.00	100.10
62	0.10	0.10	5.00	15.00	17.00	20.00	15.00	16.00	12.00	100.20
63	1.00	8.00	43.00	12.00	8.00	7.00	6.00	5.00	10.00	100.00
64	-	0.10	3.00	20.00	14.00	20.00	15.00	13.00	15.00	100.01
65	-	0.03	2.00	26.00	16.00	9.00	12.00	11.00	24.00	100.03
66	-	-	3.00	40.00	23.00	13.00	10.00	7.00	4.00	100.00
68	0.05	0.03	10.00	26.00	30.00	13.00	10.00	6.00	5.00	100.05
69	-	0.04	3.00	31.00	23.00	38.00	3.00	1.00	1.00	100.04
70	-	0.10	19.00	34.00	7.00	8.00	9.00	12.00	11.00	100.10
74	2.00	7.00	38.00	17.00	10.00	9.00	6.00	4.00	7.00	100.00
77	-	0.01	15.00	24.00	20.00	18.00	9.00	5.00	9.00	100.01

Tabelle Nr. 10
Mineralbestand außer Oeleberg

Korn- Größe (µm)	Nr. der Probe																			68	70	74	77				
	36	37	39	40	41	42	43	45	46	47	48	49	51	56	59	62	63	64	65								
Montmorin Kaolin Zeolith Fe-Mg-Silikat Fe-Oxid Rest	100.0	100.0		100.0		100.0	100.0		500					1000		1000	500	500									
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	500	1000	800	10.0		1000	100.0	300	100.0	100.0	250	750	1000	50.0		1000	70.0	90.0	50.0	50.0	1000		250	500			
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	800	1000	800	10.0		1000	100.0	500	500	50.0	750	1000	50.0			1000	10.0		50.0	50.0		75.0	400	10.0			
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	500		20.0	10.0				20.0						1000			200	10.0									
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	800	98.0	75.0	3.0	15.0	55.0	20.0	40.0	61.0	88.0	500		10.0	70.0	80.0	84.0	67.0	800	94.0	430	35.0	50.0	85.0	50	65.0	2.0	
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	200	2.0	20.0	1.0	5.0	5.0		20.0	10.0			10.0	10.0		20.0	4.0	20.0	100	1.0	6.0	30.0		10.0	18.0	10.0		
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	11.0		8.0	91.0	82.0	800	760	400	660	84.0	30.0	41.0	320	900	650	76.0	57.0	950	95.0	38.0	170	300	91.0	5.0	65.0	2.0	
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	75.0	95.0	56.0	8.0	16.0	15.0	22.0	468	20.0	10.0	70.0	490	67.0		240	16.0	25.0	2.0	3.0	550	560	70.0					
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	14.0	5.0	360	1.0	2.0	5.0	2.0	150	6.0	4.0		90		10.0	5.0			3.0	2.0		180		1.0				
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	150		100	91.0	81.0	780	850	400	620	50.0	22.0	35.0	41.0	730	660	500	52.0	61.0	96.0	410		220	79.0	10.0	58.0	2.0	
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	72.0	95.0	52.0	2.0	14.0	14.0	14.0	35.0	12.0	37.0	74.0	520	540	3.0	21.0	25.0	1.0	23.0	2.0	55.0	52.0	740					
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	9.0	4.0	18.0	7.0	5.0	8.0	1.0	20.0	23.0	8.0	3.0	3.0	6.0	12.0	12.0	17.0	25.0	13.0	2.0	4.0	7.0	3.0	6.0	25.0			
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	4.0	1.0						5.0	1.0	1.0	1.0	100		12.0	1.0	8.0		3.0			21.0	1.0	3.0	5.0			
Montmorin Kaolin Quarz Zeolith Fe-Mg-Silikat Biotit Fe-Oxid Rest	18.0	1.0	300	95.0	93.0	86.0	86.0	460	820	700	36.0	75.0	73.0	83.0	830	870	680	760	970	750	420	360	82.0	5.0			

1.200 ± 0.40

1.200 ± 0.30

Mineral	6 - 20										20 - 35										35 - 50										50 - 65										65 - 80										80 - 95										95 - 110										110 - 125										125 - 140										140 - 155										155 - 170										170 - 185										185 - 200										200 - 215										215 - 230										230 - 245										245 - 260										260 - 275										275 - 290										290 - 305										305 - 320										320 - 335										335 - 350										350 - 365										365 - 380										380 - 395										395 - 410										410 - 425										425 - 440										440 - 455										455 - 470										470 - 485										485 - 500										500 - 515										515 - 530										530 - 545										545 - 560										560 - 575										575 - 590										590 - 605										605 - 620										620 - 635										635 - 650										650 - 665										665 - 680										680 - 695										695 - 710										710 - 725										725 - 740										740 - 755										755 - 770										770 - 785										785 - 800										800 - 815										815 - 830										830 - 845										845 - 860										860 - 875										875 - 890										890 - 905										905 - 920										920 - 935										935 - 950										950 - 965										965 - 980										980 - 995										995 - 1010										1010 - 1025										1025 - 1040										1040 - 1055										1055 - 1070										1070 - 1085										1085 - 1100										1100 - 1115										1115 - 1130										1130 - 1145										1145 - 1160										1160 - 1175										1175 - 1190										1190 - 1205										1205 - 1220										1220 - 1235										1235 - 1250										1250 - 1265										1265 - 1280										1280 - 1295										1295 - 1310										1310 - 1325										1325 - 1340										1340 - 1355										1355 - 1370										1370 - 1385										1385 - 1400										1400 - 1415										1415 - 1430										1430 - 1445										1445 - 1460										1460 - 1475										1475 - 1490										1490 - 1505										1505 - 1520										1520 - 1535										1535 - 1550										1550 - 1565										1565 - 1580										1580 - 1595										1595 - 1610										1610 - 1625										1625 - 1640										1640 - 1655										1655 - 1670										1670 - 1685										1685 - 1700										1700 - 1715										1715 - 1730										1730 - 1745										1745 - 1760										1760 - 1775										1775 - 1790										1790 - 1805										1805 - 1820										1820 - 1835										1835 - 1850										1850 - 1865										1865 - 1880										1880 - 1895										1895 - 1910										1910 - 1925										1925 - 1940										1940 - 1955										1955 - 1970										1970 - 1985										1985 - 2000										2000 - 2015										2015 - 2030										2030 - 2045										2045 - 2060										2060 - 2075										2075 - 2090										2090 - 2105										2105 - 2120										2120 - 2135										2135 - 2150										2150 - 2165										2165 - 2180										2180 - 2195										2195 - 2210										2210 - 2225										2225 - 2240										2240 - 2255										2255 - 2270										2270 - 2285										2285 - 2300										2300 - 2315										2315 - 2330										2330 - 2345										2345 - 2360										2360 - 2375										2375 - 2390										2390 - 2405										2405 - 2420										2420 - 2435										2435 - 2450										2450 - 2465										2465 - 2480										2480 - 2495										2495 - 2510										2510 - 2525										2525 - 2540										2540 - 2555										2555 - 2570										2570 - 2585										2585 - 2600										2600 - 2615										2615 - 2630										2630 - 2645										2645 - 2660										2660 - 2675										2675 - 2690										2690 - 2705										2705 - 2720										2720 - 2735										2735 - 2750										2750 - 2765										2765 - 2780										2780 - 2795										2795 - 2810										2810 - 2825										2825 - 2840										2840 - 2855										2855 - 2870										2870 - 2885										2885 - 2900										2900 - 2915										2915 - 2930										2930 - 2945										2945 - 2960										2960 - 2975										2975 - 2990										2990 - 3005										3005 - 3020										3020 - 3035										3035 - 3050										3050 - 3065										3065 - 3080										3080 - 3095										3095 - 3110										3110 - 3125										3125 - 3140										3140 - 3155										3155 - 3170										3170 - 3185										3185 - 3200										3200 - 3215										3215 - 3230										3230 - 3245										3245 - 3260										3260 - 3275										3275 - 3290										3290 - 3305										3305 - 3320										3320 - 3335										3335 - 3350										3350 - 3365										3365 - 3380										3380 - 3395										3395 - 3410										3410 - 3425										3425 - 3440										3440 - 3455										3455 - 3470										3470 - 3485										3485 - 3500										3500 - 3515										3515 - 3530										3530 - 3545										3545 - 3560										3560 - 3575										3575 - 3590										3590 - 3605										3605 - 3620										3620 - 3635										3635 - 3650										3650 - 3665										3665 - 3680										3680 - 3695										3695 - 3710										3710 - 3725										3725 - 3740										3740 - 3755										3755 - 3770										3770 - 3785										3785 - 3800										3800 - 3815										3815 - 3830										3830 - 3845										3845 - 3860										3860 - 3875										3875 - 3890										3890 - 3905										3905 - 3920										3920 - 3935										3935 - 3950										3950 - 3965										3965 - 3980										3980 - 3995										3995 - 4010										4010 - 4025										4025 - 4040										4040 - 4055										4055 - 4070										4070 - 4085										4085 - 4100										4100 - 4115										4115 - 4130										4130 - 4145										4145 - 4160										4160 - 4175										4175 - 4190										4190 - 4205										4205 - 4220										4220 - 4235										4235 - 4250										4250 - 4265										4265 - 4280										4280 - 4295										4295 - 4310										4310 - 4325										4325 - 4340										4340 - 4355										4355 - 4370										4370 - 4385										4385 - 4400										4400 - 4415										4415 - 4430										4430 - 4445										4445 - 4460										4460 - 4475										4475 - 4490										4490 - 4505										4505 - 4520										4520 - 4535										4535 - 4550										4550 - 4565										4565 - 4580										4580 - 4595										4595 - 4610										4610 - 4625										4625 - 4640										4640 - 4655										4655 - 4670										4670 - 4685										4685 - 4700										4700 - 4715										4715 - 4730										4730 - 4745										4745 - 4760										4760 - 4775										4775 - 4790										4790 - 4805										4805 - 4820										4820 - 4835										4835 - 4850										4850 - 4865										4865 - 4880										4880 - 4895										4895 - 4910										4910 - 4925										4925 - 4940										4940 - 4955										4955 - 4970										4970 - 4985										4985 - 5000										5000 - 5015										5015 - 5030										5030 - 5045										5045 - 5060										5060 - 5075										5075 - 5090										5090 - 5105										5105 - 5120										5120 - 5135										5135 - 5150										5150 - 5165										5165 - 5180										5180 - 5195										5195 - 5210										5210 - 5225										5225 - 5240										5240 - 5255										5255 - 5270										5270 - 5285										5285 - 5300										5300 - 5315										5315 - 5330										5330 - 5345										5345 - 5360										5360 - 5375										5375 - 5390										5390 - 5405										5405 - 5420										5420 - 5435										5435 - 5450										5450 - 5465										5465 - 5480										5480 - 5495										5495 - 5510										5510 - 5525										5525 - 5540										5540 - 5555										5555 - 5570										5570 - 5585										5585 - 5600										5600 - 5615										5615 - 5630										5630 - 5645										5645 - 5660										5660 - 5675										5675 - 5690										5690 - 5705										5705 - 5720										5720 - 5735										5735 - 5750										5750 - 5765										5765 - 5780										5780 - 5795										5795 - 5810										5810 - 5825										5825 - 5840										5840 - 5855										5855 - 5870										5870 - 5885										5885 - 5900										5900 - 5915										5915 - 5930										5930 - 5945										5945 - 5960										5960 - 5975										5975 - 5990										5990 - 6005										6005 - 6020										6020 - 6035										6035 - 6050										6050 - 6065										6065 - 6080										6080 - 6095										6095 - 6110										6110 - 6125										6125 - 6140										6140 - 6155										6155 - 6170										6170 - 6185										6185 - 6200										6200 - 6215										6215 - 6230										6230 - 6245										6245 - 6260										6260 - 6275										6275 - 6290										6290 - 6305										6305 - 6320										6320 - 6335										6335 - 6350										6350 - 6365										6365 - 6380										6380 - 6395										6395 - 6410										6410 - 6425										6425 - 6440										6440 - 6455										6455 - 6470										6470 - 6485										6485 - 6500										6500 - 6515										6515 - 6530										6530 - 6545										6545 - 6560										6560 - 6575										6575 - 6590										6590 - 6605										6605 - 6620										6620 - 6635										6635 - 6650										6650 - 6665										6665 - 6680										6680 - 6695										6695 - 6710										6710 - 6725										6725 - 6740										6740 - 6755										6755 - 6770										6770 - 6785										6785 - 6800										6800 - 6815										6815 - 6830										6830 - 6845										6845 - 6860										6860 - 6875										6875 - 6890										6890 - 6905										6905 - 6920										6920 - 6935										6935 - 6950										6950 - 6965										6965 - 6980										6980 - 6995										6995 - 7010										7010 - 7025										7025 - 7040										7040 - 7055										7055 - 7070										7070 - 7085										7085 - 7100										7100 - 7115										7115 - 7130										7130 - 7145										7145 - 7160										7160 - 7175										7175 - 7190										7190 - 7205										7205 - 7220										7220 - 7235										7235 - 7250										7250 - 7265										7265 - 7280										7280 - 7295										7295 - 7310										7310 - 7325										7325 - 7340										7340 - 7355										7355 - 7370										7370 - 7385										7385 - 7400										7400 - 7415										7415 - 7430										7430 - 7445										7445 - 7460										7460 - 7475										7475 - 7490										7490 - 7505										7505 - 7520										7520 - 7535										7535 - 7550										7550 - 7565										7565 - 7580										7580 - 7595										7595 - 7610										7610 - 7625										7625 - 7640										7640 - 7655										7655 - 7670										7670 - 7685										7685 - 7700										7700 - 7715										7715 - 7730										7730 - 7745										7745 - 7760										7760 - 7775										7775 - 7790										7790 - 7805										7805 - 7820										7820 - 7835										7835 - 7850										7850 - 7865										7865 - 7880										7880 - 7895										7895 - 7910										7910 - 7925										7925 - 7940										7940 - 7955										7955 - 7970										7970 - 7985										7985 - 8000										8000 - 8015										8015 - 8030										8030 - 8045										8045 - 8060										8060 - 8075										8075 - 8090										8090 - 8105										8105 - 8120										8120 - 8135										8135 - 8150										8150 - 8165										8165 - 8180										8180 - 8195										8195 - 8210										8210 - 8225										8225 - 8240										8240 - 8255										8255 - 8270										8270 - 8285										8285 - 8300										8300 - 8315										8315 - 8330										8330 - 8345										8345 - 8360										8360 - 8375										8375 - 8390										8390 - 8405										8405 - 8420										8420 - 8435										8435 - 8450										8450 - 8465										8465 - 8480										8480 - 8495										8495 - 8510										8510 - 8525										8525 - 8540										8540 - 8555										8555 - 8570										8570 - 8585										8585 - 8600										8600 - 8615										8615 - 8630										8630 - 8645										8645 - 8660										8660 - 8675										8675 - 8690										8690 - 8705										8705 - 8720										8720 - 8735										8735 - 8750										8750 - 8765										8765 - 8780										8780 - 8795										8795 - 8810										8810 - 8825										8825 - 8840										8840 - 8855										8855 - 8870										8870 - 8885										8885 - 8900										8900 - 8915										8915 - 8930										8930 - 8945										8945 - 8960										8960 - 8975										8975 - 8990										8990 - 9005										9005 - 9020										9020 - 9035										9035 - 9050										9050 - 9065										9065 - 9080										9080 - 9095										9095 - 9110										9110 - 9125										9125 - 9140										9140 - 9155										9155 - 9170										9170 - 9185										9185 - 9200										9200 - 9215										9215 - 9230										9230 - 9245										9245 - 9260										9260 - 9275										9275 - 9290										9290 - 9305										9305 - 9320										9320 - 9335										9335 - 9350										9350 - 9365										9365 - 9380										9380 - 9395										9395 - 9410										9410 - 9425										9425 - 9440										9440 - 9455										9455 - 9470										9470 - 9485										9485 - 9500										9500 - 9515										9515 - 9530										9530 - 9545										9545 - 9560										9560 - 9575										9575 - 9590										9590 - 9605										9605 - 9620										9620 - 9635										9635 - 9650										9650 - 9665										9665 - 9680										9680 - 9695										9695 - 9710										9710 - 9725										9725 - 9740										9740 - 9755										9755 - 9770										9770 - 9785										9785 - 9800										9800 - 9815										9815 - 9830										9830 - 9845										9845 - 9860										9860 - 9875										9875 - 989									
---------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mineralbesand Steinbruch Oeleberg,

[illegible]

[illegible]

Mineralbestand (unter 60 μm) von
Tuffen aus dem Steinbruch Oelaberg

	Korngröße in μm	Nr. der Probe													
		2	4	6	7	11	16	18	20	22	23	25	31	32	33
	63-20	Montmorin	87.80	79.50	83.00	82.00	80.50	72.00	79.50	70.00	75.00	77.20	70.00	87.00	73.00
		Illit													
		Chlorit													
		Kaolin													
		Quarz	7.80	15.00	14.50	15.50	10.00	19.00	17.50	22.00	20.80	18.80	3.00	8.00	25.00
		Fe-Oxid	2.90	3.50	1.00	1.00	8.50	4.00	1.50	2.00	2.20	2.00	3.00	3.00	2.00
	20-6	Fe Mg-Silikate													
		Rest	1.50	2.00	1.50	1.50	1.00	2.00	1.50	6.00	2.00	2.00	24.00	2.00	
		Montmorin	95.00	88.00	88.50	86.00	90.20	85.00	83.00	83.00	84.00	87.00	73.00	84.00	75.00
		Illit													
		Chlorit													
		Kaolin													
	6-2	Quarz	4.00	8.00	8.50	12.00	4.60	11.00	15.00	12.50	12.50	10.80	2.00	9.00	20.00
		Fe-Oxid	1.00	2.00	1.00	1.00	3.50	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	5.00	4.00	3.00
		Fe Mg-Silikate													
		Rest	2.00	2.00	1.00	1.00	1.50	3.00	1.00	2.00	1.50	1.70	20.00		
		Montmorin	92.00	89.00	90.00	85.00	90.00	74.00	84.00	81.00	76.00	87.00	85.00	88.00	76.00
		Illit	3.00	4.80	3.00	5.00	4.00	10.00	5.00	8.00	5.00	4.00	4.00	5.00	10.00
	2-06	Chlorit													
		Kaolin													
		Quarz	3.00	5.00	5.00	8.00	3.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	1.00	4.00	12.00
		Fe-Oxid	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	-	4.00	2.00	2.00
		Fe Mg-Silikate											6.00		
		Rest	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00		1.00		1.00		1.00	
	2-06	Montmorin	92.00	92.00	95.00	90.00	92.00	75.00	87.00	82.00	77.00	79.00	89.00	91.00	83.00
		Illit	4.00	5.00	3.00	5.00	4.00	10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00
		Chlorit													
		Kaolin													
		Quarz	3.00	3.00	2.00	5.00	2.00	5.00	8.00	8.00	5.00	4.00	1.00	2.00	8.00
		Fe-Oxid	1.00				1.00				8.00	6.00	2.00	2.00	1.00
	2-06	Fe Mg-Silikate											1.00		
		Rest													
		Montmorin	95.00	95.00	95.00	94.00	94.00	76.00	90.00	85.00	80.00	81.00	96.00	93.00	87.00
		Illit	3.00	3.00	3.00	4.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	5.00	2.00	6.00	10.00
		Chlorit													
		Kaolin													
	2-06	Quarz	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	1.00	3.00
		Fe-Oxid													
		Fe Mg-Silikate													
		Rest											1.00	1.00	
		Montmorin	95.00	88.60	90.30	87.40	89.40	76.40	83.50	82.60	77.20	79.40	82.40	88.40	78.80
		Illit	2.00	2.40	1.80	2.80	2.60	6.00	3.00	5.60	3.00	2.80	2.20	3.00	5.60
	Mittel- werte	Chlorit													
		Kaolin													
		Quarz	4.00	6.70	6.40	8.50	4.20	8.60	12.00	10.60	3.00	2.80	9.20	1.40	4.80
		Fe-Oxid	1.30	1.30	0.60	0.60	2.90	1.00	1.00	0.70	0.60	1.00	0.50	2.40	1.60
		Fe Mg-Silikate													
		Rest	0.60	0.80	0.70	0.70	0.90	1.80	0.50	0.50	1.80	0.70	10.20	1.40	0.40

Lebenslauf

Am 31. Juli 1925 wurde ich als erstes Kind des Polizeinspektors Bhulotan Singh und seiner Ehefrau Rajmukhi Singh in Naraingarh, Bezirk Ballia, Provinz Uttarpradesh, Indien geboren.

In der Zeit von 1931 bis 1936 besuchte ich die Volksschule in Naraingarh. 1936 trat ich in die "Government Hig School Basti" in Uttarpradesh ein und bestand 1942 die "High School Examination" in erster Klasse. 1942 setzte ich mein Studium im "Udai Pratap College" in Banaras fort und beendete meine "I. Sc.-Examination" 1944 in zweiter Klasse.

Im Juli 1944 begann ich an der Universität Banaras das Geologiestudium und bestand 1947 die "B. Sc-Examination" in zweiter Klasse. 1947 setzte ich mein Studium in Geologie an der Universität von Patna fort. 1949 bestand ich meine "M. Sc.-Examination" in Geologie an erster Stelle in zweiter Klasse.

Ab 1950 leistete ich 3 1/2 Jahre Dienst an der Universität von Patna als provisorischer Lektor. 1953 trat ich in den "Government Educational Service" der Provinz Bihar als "Assistant Prof. of Geology" an der Universität von Patna ein.

Seit Oktober 1962 wurde mir von der Regierung ein Studien-Urlaub bis 31. Juli 1965 gewährt. Ich erlernte die deutsche Sprache im Goethe-Institut in Brannenburg-Degerndorf bei Rosenheim (Nov.-Dez. 1962).

Im Januar 1963 begann ich bei Prof. Dr. Th. Ernst meine Doktorarbeit mit dem Thema "Sedimentpetrographische Untersuchung der Tuffe und Tuffite des Vogelsbergs".

Fotodruck

- W. Hegl, Erlangen, Brüxer Straße 9, (Nähe Röthelheimbad) Telefon 1636 [15336] -